

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas de caráter específico;

Prova Objetiva	Nº. de Questões	Valor das questões	Total de Pontos
Conhecimentos específicos do cargo	50	2	100

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal no final.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.

04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. A folha somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

05- As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.

06- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.

07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA**.

08- Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo **TODO O ESPAÇO** compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.

09- **SERÁ ELIMINADO** do Concurso o candidato que:

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas**.

10- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua **Folha de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

11- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões da Prova Objetiva e a Folha de Respostas da Prova Objetiva, e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.

12- **O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVAS OBJETIVA É DE 4 (QUATRO) HORAS**.



◆ Conhecimentos Específicos ◆

Questão 01

Assinale a alternativa que representa um ramo terminal da artéria carótida externa:

- A) Facial
- B) Lingual
- C) Maxilar
- D) Vertebral
- E) Cerebral anterior

Questão 02

Assinale a alternativa que corresponde ao osso com o qual a mandíbula se articula com o crânio.

- A) Parietal
- B) Etimóide
- C) Temporal
- D) Esfenóide
- E) Zigomático

Questão 03

Assinale a alternativa que corresponde ao nervo responsável pela sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores da língua.

- A) Vago
- B) Facial
- C) Lingual
- D) Hipoglosso
- E) Glossofaríngeo

Questão 04

Qual é a origem do músculo masseter?

- A) Arco zigomático
- B) Linha temporal inferior
- C) Borda inferior interna da mandíbula
- D) Borda inferior externa da mandíbula
- E) Face medial da lâmina lateral do processo pterigóide

Questão 05

Assinale a alternativa que corresponde a um músculo responsável pela abertura da boca.

- A) Bucal
- B) Masseter
- C) Temporal
- D) Hioglosso
- E) Digástrico

Questão 06

O lábio superior é inervado sensitivamente pelo nervo:

- A) Bucal
- B) Incisivo
- C) Nasopalatino
- D) Infra-orbitário
- E) Alveolar superior anterior

Questão 07

Dentre os procedimentos de prevenção da cárie dentária listados abaixo, qual pode ser enquadrado no 2º Nível de Prevenção Específica?

- A) Exodontia
- B) Fluoretação da água
- C) Raspagem e alisamento radicular
- D) Tratamento restaurador atraumático
- E) Nutrição adequada no período de formação dos dentes

Questão 08

Na abordagem para educação e promoção da saúde periodontal devem ser considerados aspectos afetivos, cognitivos e psicomotores do paciente. Assinale a alternativa que se enquadra no aspecto afetivo.

- A) Reforço instrucional
- B) Noções de etiopatogenia
- C) Grau prévio de conhecimento
- D) Valorização de sua saúde bucal
- E) Treinamento do uso do instrumental indicado

Questão 09

Segundo a classificação de severidade do índice CPO-D da Organização Mundial de Saúde (OMS) um CPO-D de 2 é classificado em qual categoria:

- A) Muito baixa
- B) Baixa
- C) Moderada
- D) Severa
- E) Muito severa

Questão 10

Assinale a alternativa que corresponde a um índice de doença periodontal utilizado pelo Ministério da Saúde para os estudos epidemiológicos em periodontia:

- A) IPC
- B) CPO
- C) RNPT
- D) CPO-D
- E) CEO-D

Questão 11

Assinale a alternativa que corresponde ao tratamento necessário para casos de intoxicação leve por flúor (< de 4 mg F⁻/Kg).

- A) Cardioversão
- B) Diurese alcalina
- C) Ingestão de leite
- D) Intubação endotraqueal
- E) Infusão endovenosa de gluconato de cálcio

Questão 12

Qual é o açúcar com maior potencial cariogênico?

- A) Frutose
- B) Lactose
- C) Glicose
- D) Maltose
- E) Sacarose

Questão 13

Dentre as opções, assinale a alternativa que corresponde ao microorganismo mais patogênico em relação à cárie dental.

- A) Escherichia coli
- B) Lactobacilos casei
- C) Estafilococos aureo
- D) Estreptococos mitis
- E) Estreptococos oralis

Questão 14

Assinale a alternativa que corresponde aos dentes mais comumente afetados pela cárie em adolescentes.

- A) Molares inferiores
- B) Incisivos inferiores
- C) Molares superiores
- D) Incisivos superiores
- E) Pré-molares inferiores

Questão 15

Assinale a alternativa que representa uma característica clínica compatível com uma lesão de cárie inativa

- A) Mancha opaca
- B) Mancha rugosa
- C) Mancha brilhante
- D) Dentina amolecida
- E) Dentina de cor marrom-clara

Questão 16

Uma lesão, caracterizada como uma pequena área de elevação superficial da mucosa oral, circunscrita, não pedunculada, com forma e cor variável é denominada de:

- A) Cisto
- B) Úlcera
- C) Pápula
- D) Mácula
- E) Hematoma

Questão 17

Assinale a alternativa que corresponde a uma lesão pré-maligna que acomete a região do vermelhão do lábio inferior, principalmente em pessoas de pele clara e que está associada à exposição aos raios ultravioletas.

- A) Queilite factícia
- B) Queilite angular
- C) Queilite actínica
- D) Xantoma verruciforme
- E) Carcinoma espinocelular

Questão 18

Qual doença está relacionada à infecção pelo *Treponema pallidum*?

- A) Noma
- B) Sífilis
- C) Hanseníase
- D) Blenorragia
- E) Tuberculose

Questão 19

Assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico de uma lesão circunscrita radiolúcida com pequenos focos opacos de calcificação em seu interior relacionada à coroa de um canino superior incluso em um paciente do sexo feminino com 18 anos de idade.

- A) Cisto dentífero
- B) Fibroma ossificante
- C) Mixoma odontogênico
- D) Ameloblastoma unicístico
- E) Tumor odontogênico adenomatóide

Questão 20

Assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico de um aumento de volume na linha média do palato duro, simétrica, dura, indolor, não sangrante, não ulcerada, com coloração e mucosa normais, presente há pelo menos 20 anos em um paciente do sexo feminino com 40 anos de idade.

- A) Lesão por câmara de sucção
- B) Granuloma letal mediano
- C) Adenoma pleomorfo
- D) Adenocarcinoma
- E) Torus palatino

Questão 21

Assinale a alternativa que corresponde a síndrome caracterizada por múltiplos ceratocistos odontogênicos, costela bífida e carcinoma nevóide de células basais.

- A) Gorlin
- B) Gardner
- C) Cushing
- D) Crouzon
- E) Plummer-Vinson

Questão 22

Qual a patologia que apresenta lesão da mucosa oral com numerosas linhas brancas ceratóticas se entrecruzando, apresentando um padrão rendilhado ou de rede denominadas de estrias de Wickham?

- A) Líquen plano
- B) Pênfigo vulgar
- C) Pênfigo bolhoso
- D) Eritema multiforme
- E) Xeroderma pigmentoso

Questão 23

Qual a temperatura e o tempo correto de esterilização do instrumental odontológico através da técnica de calor seco?

- A) 120°, 2 horas
- B) 120°, 4 horas
- C) 121°, 30 minutos
- D) 160°, 16 minutos
- E) 160°, 2 horas

Questão 24

Qual o gás que utilizado para esterilizar materiais odontológicos sensíveis às altas temperaturas dos métodos de calor seco ou úmido?

- A) Hélio
- B) Argônio
- C) Óxido Nítrico
- D) Óxido de etileno
- E) Clorofluorcarbono

Questão 25

Assinale o vírus que representa o maior risco de transmissão do paciente para a equipe odontológica

- A) HIV – 1
- B) HIV – 2
- C) HPV
- D) Hepatite B
- E) Hepatite C

Questão 26

Assinale a alternativa que corresponde ao método mais eficaz de esterilização através de compostos químicos.

- A) Formaldeído a 8% por 5 horas
- B) Formaldeído a 3% por 30 minutos
- C) Iodofóro com iodo a 1% por 30 minutos
- D) Glutaraldeído alcalino a 2% por 10 horas
- E) Hipoclorito de sódio a 0,1% por 24 horas

Questão 27

Segundo Conceição EW, em relação à técnica para o preparo das superfícies dentárias para restaurações adesivas com resina composta foto-ativada é correto afirmar:

- A) A retenção da resina se dá por ligação química
- B) O ataque ácido diminui a área superficial do esmalte pela remoção de impurezas
- C) A manutenção da smear layer aumenta a resistência à tração das resinas compostas
- D) O condicionamento com ácido cítrico a 10% apresenta a melhor resistência à união da resina ao esmalte
- E) Um sistema adesivo que utiliza um primer autocondicionante com pH de 1,4 dispensa o uso de condicionamento ácido prévio

Questão 28

Qual o grampo de isolamento indicado para o isolamento de um primeiro molar inferior?

- A) 204
- B) 206
- C) 208
- D) 209
- E) 211

Questão 29

Assinale a alternativa que corresponde a uma matriz resinosa, o componente orgânico quimicamente ativo de uma resina composta.

- A) EDMA
- B) UDMA
- C) Quartzo
- D) TEGDMA
- E) Hidroquinona

Questão 30

Assinale a alternativa correta em relação às partículas inorgânicas das resinas compostas:

- A) As resinas tipo *flow* apresentam a menor contração de polimerização
- B) Quanto maior quantidade de partículas inorgânicas maior a contração de polimerização
- C) As resinas micro-híbridas apresentam melhor polimento superficial do que as microparticuladas
- D) Resinas com menor quantidade de partículas inorgânicas apresentam maior resistência ao desgaste
- E) As resinas micro-híbridas ou condensáveis apresentam melhor resistência ao desgaste superficial

Questão 31

Com relação ao amálgama de prata é correto afirmar, **EXCETO**:

- A) Apresenta alta resistência à compressão
- B) A substituição do mercúrio pelo gálio aumenta a expansão de presa
- C) Excesso de mercúrio compromete as propriedades físicas e mecânicas da restauração
- D) As ligas de amálgama de prata devem ser constituídas essencialmente de prata e estanho
- E) Apresenta elevada resiliência impedindo a transmissão dos esforços mastigatórios para a estrutura dental

Questão 32

Com relação aos cimentos ionoméricos é correto afirmar:

- A) Tem origem no cimento fosfato de zinco
- B) Apresenta elevada resistência ao desgaste
- C) Libera flúor apenas nas primeiras 24 horas após a presa
- D) Apresenta coeficiente de expansão térmica cinco vezes maior que o do dente
- E) Seu acabamento fino e polimento devem ser feito pelo menos 24 horas após a restauração

Questão 33

Segundo Conceição EM, o cimento de ionômero de vidro Tipo II é indicado para:

- A) Forramento ou base
- B) Restaurações diretas
- C) Cimentação de prótese
- D) Selamento de cicatrículas e fissuras
- E) Colagem de dispositivos ortodônticos

Questão 34

O material de moldagem denominado de alginato é um:

- A) Poliéter
- B) Polissulfeto
- C) Silicone de adição
- D) Hidrocolóide reversível
- E) Hidrocolóide irreversível

Questão 35

Assinale a alternativa que corresponde aos microorganismos associados a Gengivite Ulcerativa Necrosante Aguda (GUNA).

- A) Bastonetes anaeróbios e *Bacteróides gingivalis*
- B) Cocos Gram positivos, espiroquetas e *Wolinella recta*
- C) Espiroquetas, bactérias fusiformes e *Bacteróides intermedius*
- D) Cocos Gram negativos, *Wolinella recta* e *Eikenella corrodens*
- E) Cocos Gram positivos e *Actinobacillus actinomycetemcomitans*

Questão 36

Uma doença periodontal caracterizada por ocorrer em indivíduos com menos de 30 anos de idade, com periodontite destrutiva localizada nos primeiros molares e incisivos permanentes e não envolvendo mais que outros 2 dentes, é denominada de:

- A) Gengivite gravídica
- B) Periodontite juvenil localizada
- C) Periodontite juvenil generalizada
- D) Periodontite refratária ou recorrente
- E) Gengivite ulcerativa necrosante aguda

Questão 37

Na avaliação periodontal de um dente com lesão de furca, uma lesão que apresenta perda horizontal do tecido de suporte excedendo a um terço da largura do dente, porém não excedendo três terços desta largura é classificada como lesão de furca Classe:

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

Questão 38

As curetas de Gracey desenhadas para serem utilizadas nas superfícies distais dos dentes posteriores são as:

- A) 3 / 4
- B) 5 / 6
- C) 7 / 8
- D) 11 / 12
- E) 13 / 14

Questão 39

Durante a avaliação de um paciente para cirurgia buco-maxilo-facial seu estado físico foi classificado de acordo com o protocolo da Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA) como um paciente que apresenta doença sistêmica grave que é uma ameaça constante à vida, portanto é um paciente ASA:

- A) II
- B) III
- C) IV
- D) V
- E) VI

Questão 40

Qual dos fórceps abaixo é indicado para exodontia de um primeiro molar inferior direito bifurcado?

- A) 18R
- B) 23
- C) 151
- D) 210S
- E) 222

Questão 41

Um terceiro molar inferior incluso encontra-se com sua coroa completamente encoberta pelo bordo anterior do ramo mandibular e com sua superfície oclusal no mesmo nível da superfície oclusal do segundo molar inferior adjacente. Segundo a Classificação de Pell e Gregory como classificamos este dente:

- A) A / 1
- B) A / 3
- C) C / 1
- D) C / 2
- E) C / 3

Questão 42

Qual a incidência radiográfica mais indicada para avaliação de uma possível fratura de processo condilar da mandíbula?

- A) Towne
- B) Waters
- C) Donovan
- D) Miller-Winter
- E) Hirtz pouco penetrada

Questão 43

Qual a dose máxima, em tubetes, que podemos aplicar de uma solução de mepivacaína a 3% em um paciente com 35 Kg (dose máxima de mepivacaína é 5mg/kg)?

- A) 1
- B) 3
- C) 5
- D) 7
- E) 9

Questão 44

A angina de Ludwig é uma infecção facial que apresenta como característica o envolvimento bilateral dos seguintes espaços fasciais potenciais:

- A) Sublingual, bucal e massetérico
- B) Massetérico, bucal e submandibular
- C) Pterigomandibular, massetérico e bucal
- D) Sublingual, submandibular e submentoniano
- E) Pterigomandibular, retrofaríngeo e submandibular

Questão 45

Assinale a alternativa que corresponde a um analgésico que, acredita-se, apresente como mecanismo de ação a depressão direta da atividade dos nociceptores, agindo mais eficazmente sobre a dor já instalada.

- A) Piroxicam
- B) Nimesulida
- C) Paracetamol
- D) Dipirona Sódica
- E) Ácido acetilsalicílico

Questão 46

Qual o antibiótico de escolha para o controle de uma infecção odontogênica aguda ou para a profilaxia antibiótica da endocardite bacteriana em pacientes alérgicos à penicilina.

- A) Doxiciclina
- B) Eritromicina
- C) Azitromicina
- D) Clindamicina
- E) Dicloxacilina

Questão 47

Um aumento de volume unilateral na face, levando a elevação da asa do nariz e apagamento do sulco nasolabial, podendo envolver a pálpebra inferior homolateral, provavelmente, está relacionado a um problema endodôntico em qual elemento dentário?

- A) Incisivo central
- B) Incisivo lateral
- C) Canino
- D) Primeiro pré-molar
- E) Terceiro molar

Questão 48

Segundo Cohen S., com relação aos testes de vitalidade pulpar em endodontia é correto afirmar:

- A) No teste ao calor os dentes devem ser isolados por quadrante e testados em seqüência de anterior para posterior
- B) O teste ao frio deve ser feito com pedra de gelo e sem isolamento para que a região cervical possa ser estimulada
- C) O teste ao frio apresenta uma precisão de cerca de 86%, maior do que o teste ao calor e do que o teste elétrico
- D) Dentes multirradiculares necrosados, mesmo com uma raiz com tecido pulpar vital não consegue responder ao teste ao frio
- E) O teste elétrico é mais eficaz para dentes com coroas totais metálicas quando nenhuma estrutura dentária visível estiver disponível

Questão 49

Na instrumentação dos canais radiculares, uma vez que os orifícios dos canais tenham sido encontrados, a porção cervical dos canais deve ser alargada ou moldada em forma de cone com uma broca:

- A) LN
- B) Muller
- C) Gates-Glidden
- D) Cônico-esférica diamantada
- E) Esférica 6 diamantada

Questão 50

Assinale a alternativa que corresponde a solução empregada em endodontia que é um quelante, utilizada para remoção do *smear layer*.

- A) Clorexidina
- B) Hidróxido de cálcio
- C) Hipoclorito de sódio
- D) Iodeto de potássio iodetado
- E) Ácido etilenodiaminotetracético

