



# TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Concurso Público para provimento de cargos de

**Analista Judiciário**

**Área Apoio Especializado - Especialidade Odontologia**

Caderno de Prova, Cargo I09 , Tipo 001

000000000000000000

00001-001-001

Nº de Inscrição  
MODELO

P R O V A

Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos

## INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
  - corresponde a sua opção de cargo.
  - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.  
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

### VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) ○ (D) ○ (E) ○

### ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS  
Março/2006

**CONHECIMENTOS GERAIS**

**Atenção:** As questões de números 1 a 15 referem-se ao texto que segue.

**Instituições e instituições**

*O homem não vive sem as instituições – sejam elas políticas, religiosas, jurídicas, financeiras, educacionais, esportivas ou de qualquer outra natureza, importância e amplitude. Do pequeno clube recreativo do interior ao Estado nacional ou à Igreja milenar, temos criado desde nossa origem instituições de todo tipo, por meio das quais nos agrupamos em torno dos mais distintos interesses, que tanto podem ser a devoção por uma escola de samba como a implantação de um sistema nacional de educação. As instituições, entendidas nesse amplo espectro, nascem, crescem, se transformam ou morrem segundo as necessidades nossas. Em princípio, elas são criadas para assegurar os fundamentos da ordem, da organização, da parceria, do conagração, do espírito coletivo. Estamos conscientes de que, sem elas, imperaria o caos, a barbárie, a violência, a lei da selva.*

*No entanto, mesmo com a multiplicação das instituições, não conhecemos nenhuma época histórica que não tenha sido marcada por conflitos, ódios e terremotos sociais. Isto nos leva a crer que, embora necessárias, múltiplas e atuantes, as instituições não asseguram o ordenamento social, a propagação da justiça, a harmonização dos interesses. Pode mesmo ocorrer o contrário: há instituições ditas “organizadas” que prosperam na atividade criminosa, disseminando o mandonismo, o ódio e a violência. Isso significa que a criação mesma de instituições pode ser motivada por um instinto destrutivo, discriminativo, hostil aos princípios básicos da civilização. “Crime organizado”, “formação de quadrilha”, “corporativismo” são expressões que lembram os diferentes modos pelos quais se podem instituir forças socialmente negativas e deletérias.*

*Uma grande dificuldade é a de discernir entre as instituições saudáveis, que de fato correspondem a algum interesse social, e aquelas que só se instalam como aparelho organizacional para mesquinamente auferir vantagens, cercear direitos, garantir privilégios. Outra grande dificuldade está em distinguir, dentro das instituições públicas oficiais, democraticamente criadas, os indivíduos ou grupos de indivíduos que se valem exatamente da imagem de legitimidade delas para, furtivamente, fazerem valer seus interesses particulares. O efeito desse tipo de ação é dos mais nefastos: quando se desmoraliza, pela ação de uma pequena parcela de delinqüentes, a imagem de uma instituição pública saudável e necessária, propaga-se a crença de que a sociedade deva ser controlada pelo poder da força. Isso leva, como a História tem mostrado, à implantação das piores ditaduras, dos regimes de exceção, do autoritarismo e do sectarismo terrorista – exemplos das instituições macabras que os homens – lamentavelmente – criam contra sua própria humanidade.*

(Saulo de Magalhães)

1. A repetição de palavra que há no título desse texto – **Instituições e instituições** – justifica-se porque, com esse procedimento, o autor
  - (A) encarece, de modo enfático, a importância que as instituições saudáveis assumem em qualquer tipo de organização social.
  - (B) considera a necessidade de discernir entre as instituições de efetivo valor social e as manipuladas por interesses reprováveis.
  - (C) manifesta sua descrença nas instituições que se multiplicam para melhor contemplar os interesses mesquinhos de grupos minoritários.
  - (D) alude à divisão entre as instituições permanentes, como a da Igreja, e as transitórias, como a de uma corporação pouco expressiva.
  - (E) acentua a necessidade social de preservar as instituições, adaptando-as, para isso, às diferentes contingências históricas.

---

2. Considere as seguintes afirmações:
  - I. No primeiro parágrafo, o autor reconhece a importância das instituições, analisa as modalidades em que se dividem e critica a finalidade nefasta para a qual algumas são criadas.
  - II. No segundo parágrafo, o autor não admite a possibilidade de que as instituições deletérias se organizem de modo eficaz, em virtude de atenderem a interesses outros que não os sociais.
  - III. No terceiro parágrafo, o autor estabelece uma relação entre o aviltamento das instituições públicas e as graves conseqüências políticas que decorrem disso.

Em relação ao texto, está correto o que se afirma APENAS em

  - (A) I.
  - (B) II.
  - (C) III.
  - (D) I e II.
  - (E) II e III.

---

3. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de uma expressão do texto em:
  - (A) *forças socialmente negativas e deletérias* = poderes anti-sociais e destrutivos.
  - (B) *não asseguram o ordenamento social* = não asseveraram o enquadramento da sociedade.
  - (C) *disseminando o mandonismo* = refluindo o autoritarismo.
  - (D) *entendidas nesse amplo espectro* = apreendidas nesse quadro difuso.
  - (E) *mesquinamente auferir vantagens* = tolamente conferir privilégios.

---

4. No terceiro parágrafo, afirma o autor que a imagem de legitimidade das instituições
  - (A) acaba evitando que se propaguem as iniciativas dos indivíduos sem escrúpulos.
  - (B) revela o sentido público que podem ganhar algumas iniciativas privadas.
  - (C) acentua, inequivocamente, o interesse pessoal de quaisquer iniciativas.
  - (D) garante a plena realização das iniciativas de quem deseja o bem comum.
  - (E) pode vir a servir ao encobrimento da prática de ações interesseiras e inconfessáveis.

<p>5. Estamos conscientes de que, sem as instituições, imperaria o caos, a barbárie, a violência, a lei da selva.</p> <p>Uma outra forma correta de expressar o que diz a frase acima é: <i>Estamos conscientes de que imperaria o caos, a barbárie, a violência, a lei da selva,</i></p> <p>(A) porquanto não houvessem as instituições.          (B) no caso delas não terem havido.          (C) deixassem as instituições de nos faltar.          (D) não fossem as instituições.          (E) não obstante as instituições.</p>	<p>10. No terceiro parágrafo, o primeiro período se inicia com a expressão <i>Uma grande dificuldade</i> e o segundo se inicia com a expressão <i>Outra grande dificuldade</i>. Há, entre esses dois períodos, uma relação que exprime</p> <p>(A) uma sucessão de alternativas.          (B) um nexos de causalidade.          (C) uma justaposição simples.          (D) uma contradição insuperável.          (E) um critério hierárquico.</p>
<p>6. Há plena observância das normas de concordância verbal na frase:</p> <p>(A) Sempre haverá os que lucram com quaisquer iniciativas de que resulte algum ônus para a imagem de confiabilidade de que carecem as instituições públicas.          (B) A crescente disseminação de instituições que trabalham contra os interesses populares constituem um verdadeiro flagelo dos tempos modernos.          (C) É curioso chamarem-se <i>crime organizado</i> a um tipo de iniciativas que investe, exatamente, contra a ordem social.          (D) Não aprovuessem aos homens criar instituições, certamente viveríamos todos sob o signo da violência e da barbárie.          (E) Tudo o que tem mostrado as sucessivas civilizações faz concluir que as instituições servem tanto aos bons quanto aos maus propósitos humanos.</p>	<p>11. Está correta a flexão de todas as formas verbais na frase:</p> <p>(A) Em respeito à ética, se os interesses particulares se contrapuserem aos públicos, devem prevalecer estes, e não aqueles.          (B) Ao longo do tempo, os corruptos nem sempre se desaviram com as instituições; pelo contrário, muitos souberam usá-las em benefício próprio.          (C) Caso não detêssemos boa parte dos nossos ímpetos destrutivos, nenhuma sociedade conheceria um momento sequer de estabilização.          (D) Quando os estados nacionais não intervêm nas instituições corrompidas, a ordem social tende a fragilizar-se cada vez mais.          (E) Se tivessem prevalecido as boas causas pelas quais nossos antepassados tiveram de lutar, estaríamos hoje numa sociedade mais justa.</p>
<p>7. Transpondo-se para a voz passiva o segmento <i>instituições macabras que os homens – lamentavelmente – criam contra sua própria humanidade</i>, a forma verbal resultante será</p> <p>(A) estão sendo criadas.          (B) são criadas.          (C) foram criadas.          (D) têm criado.          (E) têm sido criadas.</p>	<p>12. O verbo entre parênteses deverá flexionar-se, obrigatoriamente, numa forma do <b>plural</b>, para preencher de modo correto a lacuna da frase:</p> <p>(A) ..... -lhes (<b>parecer</b>) justo que as instituições sejam manipuláveis?          (B) Eles, a quem nenhuma instituição jamais ..... (<b>impor</b>) quaisquer restrições, são os que mais reclamam.          (C) Caso não se ..... (<b>assegurar</b>) às minorias o direito de se expressarem, as maiorias acabarão exercendo um poder totalitário.          (D) Se não ..... (<b>vir</b>) a ocorrer, em qualquer sociedade, tantos desmandos institucionais, não haveria a necessidade de tantos organismos de fiscalização.          (E) É por ..... (<b>disseminar</b>) ódios e privilégios que muita instituição acaba se desmoralizando a si mesma.</p>
<p>8. Na frase <i>No entanto, mesmo com a multiplicação das instituições, não conhecemos nenhuma época histórica que não tenha sido marcada por conflitos</i>, o segmento sublinhado pode ser corretamente substituído, sem prejuízo para o sentido, por:</p> <p>(A) Ainda assim, contando com a          (B) Porém, ainda que houvesse a          (C) Apesar disso, pelo fato de haver a          (D) Todavia, apesar da          (E) Por conseguinte, a despeito da</p>	<p>13. Todas as palavras estão corretamente grafadas na frase:</p> <p>(A) A obsolescência das instituições constitui um dos grandes desafios dos legisladores, cuja função é reconhecer as solicitações de sua contemporaneidade.          (B) Ao se denigrarem as boas reputações, desmoralizam-se os bons valores que devem reger uma sociedade.          (C) A banalização dos atos anti-sociais é um sintoma da doença do nosso tempo, quando a barbárie dissimula-se em rotina.          (D) Quando, numa mesma ação, convergem defeitos e méritos, confundimo-nos, na tentativa de discriminá-los.          (E) Os hábitos que medeiam as relações sociais são louváveis, quando eticamente instituídos, e odiosos, quando ensejam privilégios.</p>
<p>9. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase:</p> <p>(A) O homem não prescinde das instituições, <u>com as quais</u> costuma se valer para a organização da sociedade.          (B) Sem as instituições, <u>nas quais</u> é possível atribuir a propriedade do disfarce, não haveria formas de organização social.          (C) Nos piores momentos da história, <u>aonde</u> vicejam os regimes de exceção, o homem reconhece sua vocação mais nefasta.          (D) A desmoralização das instituições públicas é uma iniciativa <u>de cuja</u> responsabilidade se deve aos delinqüentes de todo tipo.          (E) Criando instituições, <u>para cuja</u> estabilidade concorre o esforço de muitos, os homens buscam se reconhecer como cidadãos.</p>	

<p>14. Atentando-se para a adequada articulação entre os tempos e os modos verbais, completa-se a frase <b>Caso não fossem necessárias as instituições</b> com o seguinte segmento:</p> <p>(A) haverão os homens de tê-las criado?          (B) por que os homens as haverão de criar?          (C) tê-las-íamos criado?          (D) ainda assim as teremos criado?          (E) tê-las-emos criado?</p>	<p>18. Tício, aprovado em concurso público, foi nomeado para determinado cargo público e tomou posse. Todavia, deixou, sem justa causa, de entrar em exercício no prazo determinado. Nesse caso, Tício estará sujeito à</p> <p>(A) dispensa.          (B) demissão.          (C) exoneração de ofício.          (D) disponibilidade.          (E) aposentadoria compulsória.</p>
<p>15. Está clara e correta a redação da seguinte frase:</p> <p>(A) Se muitas vezes as instituições públicas abrigam interesses privados, é quando os homens percebem que podem usá-las ao seu bel prazer.          (B) Historicamente, a implantação de ditaduras tem ocorrido em consequência do desprestígio e do aviltamento das instituições públicas.          (C) É o cúmulo que se tratem por organizadas toda instituição cuja finalidade irregular surge como se fosse do interesse público.          (D) Basta procurarmos na História alguma época em que imperou a harmonia absoluta para não encontrarmos uma sequer de que pudéssemos exemplificar.          (E) Embora variem muito quanto a finalidade, está no princípio de todas as instituições o valor social com cujo os homens as terão concebido.</p>	<p>19. Considere as assertivas a respeito da acumulação de cargos públicos:</p> <p>I. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimentos de um cargo público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.          II. A proibição de acumular não se estende a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas e empresas públicas.          III. A proibição de acumular não se estende a cargos, empregos e funções em sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.</p> <p>Está correto o que se afirma APENAS em</p> <p>(A) I.          (B) I e II.          (C) I e III.          (D) II e III.          (E) III.</p>
<p>16. De acordo com a Lei nº 8.112, de 11/12/90, com relação ao provimento de cargo público, é correto afirmar que</p> <p>(A) o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício é de 30 dias, contados da data da posse.          (B) às pessoas portadoras de deficiência serão reservadas 15% das vagas oferecidas em concurso público.          (C) a investidura em cargo público isolado de provimento efetivo ocorrerá com a nomeação.          (D) a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento.          (E) o concurso público para provimento de cargo de carreira terá a validade de 2 anos improrrogáveis.</p>	<p>20. A respeito da responsabilidade civil, penal e administrativa do servidor pelo exercício irregular de suas atribuições, é correto afirmar:</p> <p>(A) A obrigação de reparar o dano é personalíssima, não se estendendo aos herdeiros e sucessores do servidor.          (B) A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho de cargo ou função.          (C) O servidor não responderá, por meio de ação regressiva, perante a Fazenda Pública, por dano causado a terceiros.          (D) A responsabilidade civil decorre apenas de ato comissivo ou omissivo doloso, de que resulte prejuízo a terceiros.          (E) A responsabilidade administrativa é independente da criminal e não será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.</p>
<p>17. Readaptação é</p> <p>(A) o retorno à atividade de servidor em disponibilidade, mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.          (B) o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.          (C) a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultando de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial.          (D) o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou em virtude de reinvestidura do anterior ocupante.          (E) a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.</p>	

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

21. Paciente com 15 anos de idade, sexo feminino, tem apenas três restaurações, porém com higiene oral deficiente. Identifique o método e a correspondente finalidade que o cirurgião-dentista deve utilizar no diagnóstico de cárie.

- (A) Exame radiográfico periapical → detecção de lesões fechadas de cingulo.
- (B) Exame radiográfico interproximal → identificação de cárie oclusal incipiente.
- (C) Separação temporária de dentes posteriores → inspeção visual de superfícies proximais.
- (D) Evidenciador de cárie → detecção de cárie em esmalte.
- (E) Método tátil com sonda exploradora → lesão oclusal cavitada.

22. Paciente com 9 anos de idade, sexo feminino, apresenta-se com suspeita de dente extranumerário na região anterior da maxila. No exame radiográfico, para o diagnóstico e a localização corretos, a técnica indicada é

- (A) Clark.
- (B) paralelismo.
- (C) bisettriz.
- (D) interproximal.
- (E) cefalométrica.

**Instruções:** Para resolução das questões de números 23 a 25, considere o enunciado a seguir:

*Paciente do sexo masculino, 21 anos de idade, apresenta ulceração na mucosa jugal com centro necrótico amarelo-esbranquiçado e borda eritematosa, de formato ovóide. O paciente refere sensação dolorosa e relata estar passando por uma fase de tensão emocional.*

23. Para diagnóstico e planejamento terapêutico, qual exame complementar deve ser solicitado como recurso subsidiário?

- (A) Leucometria.
- (B) Biópsia excisional.
- (C) Biópsia incisiva.
- (D) Esfregaço.
- (E) Nenhum.

24. O quadro descrito é compatível com o diagnóstico de

- (A) candidíase.
- (B) estomatite herpética.
- (C) micose.
- (D) estomatite aftosa.
- (E) líquen plano.

25. Para o tratamento é indicada a prescrição de

- (A) penicilina.
- (B) triancinolona em orabase.
- (C) anfotericina B.
- (D) clorexidina.
- (E) estreptomina.

**Instruções:** Para resolução das questões de números 26 a 28, considere o enunciado a seguir:

*Paciente com 8 anos de idade, sexo masculino, apresenta-se para a consulta odontológica visando à elaboração de um plano preventivo-terapêutico.*

26. No quadro abaixo o achado clínico que apresenta correspondência com o achado histológico é:

	Achado clínico	Achado histológico quanto à desmineralização
A	Cavitação no esmalte com exposição da dentina.	Terço médio da dentina.
B	Pequena mudança na translucidez após secagem prolongada.	50% da camada externa do esmalte.
C	Opacidade de difícil visualização na superfície molhada, mas visível após secagem.	25% da camada interna do esmalte.
D	Destruição localizada do esmalte e descoloração acinzentada na dentina subjacente.	Terço mais interno da dentina.
E	Opacidade visível sem secagem.	Cerca de 50% do esmalte e 1/3 da dentina.

27. A avaliação do risco de cárie consiste em

- (A) direcionar os procedimentos preventivos para os dentes com menor probabilidade de ter cárie.
- (B) prever se o paciente desenvolverá lesões de cárie em um determinado período de tempo.
- (C) direcionar os procedimentos preventivos para os dentes com média probabilidade de ter cárie.
- (D) propor ações específicas de promoção de saúde para os dentes que apresentam cárie.
- (E) promover ações específicas de educação em saúde para o paciente que não apresenta cárie.

28. A implementação de procedimentos preventivos visa evitar o desenvolvimento de novas lesões de cárie e deve contemplar

- (A) bochechos semanais com solução de fluoreto de sódio a 0,2%.
- (B) bochechos diários com solução de fluoreto de sódio a 0,2%.
- (C) aplicação tópica de gel de fluoreto de sódio a 1,23% sobre lesões ativas.
- (D) aplicação tópica de gel de fluoreto de sódio a 0,2% sobre lesões ativas.
- (E) aplicação tópica de gel de fluoreto de sódio a 1,23% sobre lesões inativas.

29. Com relação ao preparo cavitário de um dente com lesão de cárie, considere as afirmativas a seguir:

- I. A remoção da dentina cariada associada à preservação de estrutura dentária é um binômio indispensável.
- II. A manutenção de cristas marginais e vertentes cuspidas não favorece a resistência da restauração.
- III. O preparo de superfícies proximais deve obedecer a princípios biomecânicos conservadores.
- IV. A limpeza da cavidade é dispensável quando o material restaurador for o amálgama.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

**Instruções:** Para resolução das questões de números 30 e 31, considere o enunciado a seguir:

*Paciente do sexo masculino, 5 anos de idade, apresenta-se com lesões de manchas brancas nos dentes anteriores e posteriores, além de lesões primárias de cárie em fase ativa e cavidades em todos os molares. Radiograficamente, estas lesões se encontram a aproximadamente 1 mm da polpa.*

30. O tratamento deve ser iniciado com os procedimentos de
- (A) remoção imediata de tecido cariado e restauração com amálgama e restauração das manchas brancas com cimento de ionômero de vidro.
  - (B) adequação do meio com cimento de ionômero de vidro e restauração das manchas com resina composta.
  - (C) remoção imediata de tecido cariado e restauração com amálgama e remineralização das manchas brancas.
  - (D) adequação do meio com cimento de ionômero de vidro e remineralização das manchas brancas.
  - (E) tratamento expectante dos molares e restauração das manchas brancas com resina composta.

31. No tratamento da cárie dentária, é INCORRETO
- (A) promover mudanças de comportamento, evitando recidivas.
  - (B) abordar as causas, promovendo adequação do meio bucal.
  - (C) restaurar as lesões, concluindo assim a reabilitação.
  - (D) reduzir os focos infecciosos, dificultando a implantação da microbiota cariogênica.
  - (E) evitar excessos de material restaurador, visando à redução de nichos infecciosos.

32. O ramo do nervo mandibular e as respectivas estruturas anatômicas por ele inervadas estão corretamente identificados em:

	Nervo	Estruturas anatômicas
A	Incisivo	Pré-molares, canino e incisivos inferiores
B	Mentoniano	Língua e gengiva do lado lingual
C	Alveolar inferior	Mucosa e gengiva vestibular na região de molares
D	Aurículo-temporal	Gengiva vestibular e mucosa do lábio inferior
E	Bucal	Dentes inferiores

33. Na execução de um preparo cavitário de dente permanente com extensa lesão de cárie, deve-se levar em consideração a forma de conveniência, de modo que a saúde dos tecidos periodontais circundantes seja preservada, o que pode ser feito por meio de alguns procedimentos, EXCETO:

- (A) gengivoplastia para cavidade Classe V.
- (B) gengivectomia para cavidade Classe III.
- (C) cunha proximal para cavidade Classe II.
- (D) gengivoplastia para cavidade Classe I.
- (E) aumento de coroa clínica.

34. Em relação à limpeza da cavidade para remoção de partículas remanescentes do preparo cavitário, é correto afirmar:

- (A) o peróxido de hidrogênio a 10% tem ação germicida e remove microfragmentos da camada superficial externa, bem como a *smear plug*.
- (B) o ácido poliacrílico remove a *smear on*, oferecendo menor quantidade de íons cálcio e fosfato para o processo de adesão.
- (C) o ácido fosfórico a 37% promove o fechamento dos canaliculos dentinários, possibilitando a penetração do adesivo.
- (D) o hipoclorito de sódio usado alternadamente com a água oxigenada atua como agente clareador das estruturas dentárias, não necessitando ser neutralizado após o uso.
- (E) as substâncias à base de hidróxido de cálcio são usadas em preparo com qualquer profundidade, limpando mecanicamente a cavidade e neutralizando sua acidez.

**Instruções:** Para resolução das questões de números 35 e 36, considere o enunciado a seguir:

*Paciente com 23 anos de idade, sexo masculino, apresenta os dentes 15, 16 e 17 com lesões extensas de cárie, requerendo restaurações Classe II de amálgama.*

35. Ao optar por uma liga constituída por partículas irregulares (limalhas) deve-se considerar, na manipulação, que esta liga:
- I. necessita de menos mercúrio para a amalgamação.
  - II. necessita de mais mercúrio para a amalgamação.
  - III. oferece menor resistência à condensação.
  - IV. apresenta condensabilidade de compactação positiva durante a inserção na cavidade.
  - V. tem características granulosas durante a escultura.
  - VI. é mais fácil de esculpir, brunir e polir.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, III e V.
- (B) II, III e IV.
- (C) II, IV e V.
- (D) III, IV e VI.
- (E) IV, V e VI.

36. Se a escolha recair sobre uma liga constituída por partículas esféricas ou esferoidais, para obter boa adaptação marginal, é necessário
- (A) empregar uma fita matriz de menor espessura.
  - (B) usar condensadores de pequeno diâmetro.
  - (C) utilizar alta pressão de condensação.
  - (D) evitar a utilização de cunhas de madeira.
  - (E) utilizar maior proporção de mercúrio.

37. Com relação à etiologia bacteriana das periodontites, considere as afirmativas a seguir sobre o *Actinobacillus actinomycetemcomitans*.

- I. É raramente isolado em lesões periodontais, sendo encontrado em menos de 10% de pacientes com periodontite juvenil localizada.
- II. É geralmente isolado em lesões periodontais de mais de 90% de pacientes com periodontite juvenil localizada.
- III. Não produz substâncias potencialmente patogênicas, porém pode transportar-se através de membranas epiteliais.
- IV. Pode transportar-se através de membranas epiteliais e produz leucotoxinas, sendo capaz de, em experimentos, induzir doença em animais.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I e IV.
- (D) II e III.
- (E) II e IV.

38. Paciente com 13 anos de idade, sexo feminino, apresenta perda de inserção de 4 mm nos dentes 36, 46, 31, 32, 41 e 42. Há relato de condição clínica semelhante em sua irmã de 15 anos de idade. Estes sinais clínicos são condizentes com o diagnóstico de periodontite

- (A) pré-puberal localizada.
- (B) juvenil localizada.
- (C) pré-puberal generalizada.
- (D) de acometimento precoce generalizado.
- (E) juvenil associada a condições sistêmicas.

39. Tendo por objetivo desorganizar o biofilme dental e prevenir a recorrência de depósitos bacterianos localizados supra e subgingivalmente nas superfícies dentárias, é INCORRETA a afirmativa:

- (A) no método de Bass, a cabeça da escova é aplicada em ângulo de 45° em relação ao eixo longitudinal dos dentes.
- (B) o método de Charters é eficaz na limpeza dos espaços interdentais quando as papilas estão retraídas.
- (C) o método de Bass é eficaz na remoção de depósitos moles localizados imediatamente acima e abaixo da margem gengival.
- (D) o método de Bass é indicado nos casos de retração das papilas interdentais.
- (E) no método de Charters, a cabeça da escova é aplicada sobre o dente em um ângulo de aproximadamente 45° com o plano oclusal.

40. O *Actinobacillus actinomycetemcomitans*, no tratamento da periodontite de acometimento precoce,

- (A) está protegido pelo biofilme na placa subgingival intacta, razão pela qual antibióticos sistêmicos são mais eficazes que o debridamento mecânico.
- (B) pode ser suprimido com o metronidazol em combinação com a amoxicilina, de maneira menos eficiente que os regimes de antibiótico único.
- (C) pode ser suprimido por meio de um prolongado período de debridamento mecânico, suplementado pela administração sistêmica de metronidazol e amoxicilina.
- (D) é suprimido abaixo dos níveis de detecção pela raspagem e alisamento radicular.
- (E) é suprimido mais eficientemente por intervenção cirúrgica para acesso a lesões tanto rasas quanto profundas.

Instruções: Para resolução das questões de números 41 e 42, considere o enunciado a seguir:

*Paciente com 49 anos de idade, sexo feminino, apresenta retração do tecido marginal além da junção mucogengival dos dentes 14 a 24. A gengiva encontra-se saudável e as superfícies radiculares expostas mostram defeitos de abrasão, sugerindo trauma por escovação. Radiograficamente, não há perda óssea.*

41. A classificação e a modalidade de proteção radicular que pode ser obtida por meio de intervenção cirúrgica está corretamente expressa em

	Classe	Proteção
A	I	completa
B	II	parcial
C	II	completa
D	III	parcial
E	IV	completa

42. Para prevenir a progressão da retração nesta paciente, indica-se EVITAR a técnica de escovação

- (A) Bass.
- (B) Stillman modificado.
- (C) Fones.
- (D) vertical.
- (E) horizontal.

Instruções: Para resolução das questões de números 43 e 44, considere o enunciado a seguir:

*Paciente com 26 anos de idade, sexo masculino, relata ter realizado restauração do dente 26 duas semanas antes desta consulta. O paciente apresenta queixa de dor ao morder ou mastigar. O exame clínico mostra respostas normais ao teste de sensibilidade térmica, porém a dor é desencadeada com o teste de percussão.*

43. O quadro é compatível com o diagnóstico de periodontite apical

- (A) com pulpite aguda.
- (B) crônica.
- (C) com abscesso.
- (D) com fístula.
- (E) aguda.

<p>44. O tratamento consiste em</p> <p>(A) instrumentação completa do canal, desinfecção com irrigação antibacteriana e medicação intracanal.</p> <p>(B) ajuste da oclusão, assegurando que não haja contatos prematuros.</p> <p>(C) drenagem do exsudato, abertura de uma cavidade de acesso e inserção de uma lima compatível através do ápice para escape.</p> <p>(D) antibioticoterapia em caso de sinais sistêmicos e sintomas como febre, mal-estar e infecção progressivamente difusa.</p> <p>(E) terapia analgésica utilizando drogas antiinflamatórias não-esteróides a cada 6 horas.</p>	<p>48. Paciente com 5 anos de idade, sexo feminino, tem indicação de extração a fórceps do dente 85. A extração a fórceps envolve os seguintes procedimentos:</p> <p>I. fixação do fórceps.</p> <p>II. intrusão.</p> <p>III. movimentos para lingual.</p> <p>IV. luxação para vestibular.</p> <p>V. avulsão do dente.</p> <p>A seqüência dos procedimentos está correta APENAS em</p> <p>(A) IV, III, II e I.</p> <p>(B) III, IV, I e II.</p> <p>(C) II, III, I e IV.</p> <p>(D) I, III, IV e V.</p> <p>(E) I, II, III e V.</p>
<p>45. Para estabelecer um diagnóstico pulpar, considera-se uma polpa irreversivelmente inflamada quando se constata:</p> <p>(A) ausência de dor espontânea; ausência de história passada de dor e exposição pulpar presente.</p> <p>(B) dor ao calor, aliviada pelo frio; dor à percussão e ausência de dor espontânea.</p> <p>(C) dor à percussão; ausência de dor espontânea e ausência de história passada de dor.</p> <p>(D) exposição pulpar presente; dor ao calor, aliviada pelo frio e dor à percussão.</p> <p>(E) ausência de história passada de dor; exposição pulpar presente e dor à percussão.</p>	<p>49. Paciente com 6 anos de idade, sexo masculino, tem indicação de extração do dente 75. Com relação à técnica de odontosecção, é INCORRETO afirmar que</p> <p>(A) a separação dos segmentos dentários é realizada com o uso de enxada apical.</p> <p>(B) o corte perpendicular com instrumento rotatório deve ultrapassar o assoalho da câmara pulpar.</p> <p>(C) molares superiores e inferiores podem ser extraídos por meio desta técnica.</p> <p>(D) estruturas birradiculares são transformadas em estruturas unirradiculares.</p> <p>(E) o fórceps é utilizado para luxação e extração de cada parte seccionada do dente.</p>
<p>46. Paciente com 16 anos de idade, sexo feminino, apresenta lesão de cárie profunda no dente 36. Em abertura coronária, verifica-se coroa dentária com paredes espessas e resistentes, o remanescente pulpar com aspecto consistente e sangramento vermelho vivo. O procedimento indicado é</p> <p>(A) pulpotomia.</p> <p>(B) pulpectomia.</p> <p>(C) curetagem pulpar.</p> <p>(D) proteção pulpar direta.</p> <p>(E) proteção pulpar indireta.</p>	<p>50. Para a prevenção da cárie dentária pode-se interferir no mecanismo de ataque em vários pontos da cadeia, entre eles,</p> <p>(A) aumentando a freqüência de desmineralização do esmalte.</p> <p>(B) reduzindo o pH do meio bucal abaixo do nível crítico.</p> <p>(C) reduzindo os açúcares presentes na dieta.</p> <p>(D) reduzindo a freqüência de remineralização do esmalte.</p> <p>(E) neutralizando o pH da placa bacteriana dentária a níveis inferiores a 5,5.</p>
<p>47. Para evitar a ocorrência de mordidas nos lábios e nas bochechas em casos de anestesia prolongada, em criança de 3 anos de idade, é contra-indicado o uso de anestésico local de longa duração, como</p> <p>(A) lidocaína 2% com noradrenalina 1:50.000.</p> <p>(B) lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000.</p> <p>(C) prilocaína 3% com octapressin 0,03 UI.</p> <p>(D) mepivacaína 2% com adrenalina 1:100.000.</p> <p>(E) bupivacaína 0,5% com adrenalina 1:200.000.</p>	<p>51. Considere as afirmativas abaixo em relação à prevenção da cárie dentária, em uma criança de 7 anos, sexo feminino, com restaurações nas superfícies oclusais de 6 molares deciduos:</p> <p>I. não é indicada a aplicação de selantes oclusais.</p> <p>II. em área não fluoretada, é necessário o uso de flúor tópico.</p> <p>III. é indicada a aplicação de selantes oclusais.</p> <p>IV. em área não fluoretada, não é necessário o uso de flúor tópico.</p> <p>Está correto o que se afirma APENAS em</p> <p>(A) I e II.</p> <p>(B) I e III.</p> <p>(C) I e IV.</p> <p>(D) II e III.</p> <p>(E) II e IV.</p>

<p>52. Com relação à fluoretação das águas de abastecimento público é correto afirmar que</p> <p>(A) constitui um método eficaz, eficiente, seguro e de baixo custo na prevenção da cárie dentária.</p> <p>(B) é um método de controle da cárie e doença periodontal de relativo impacto social.</p> <p>(C) os níveis ótimos de flúor independem da relação com a temperatura média anual.</p> <p>(D) a vigilância sanitária não deve exercer mecanismos de heterocontrole da qualidade da água.</p> <p>(E) os níveis ideais de flúor dependem da existência de fluoretos na água de abastecimento.</p>	<p>57. O tratamento consiste em</p> <p>(A) ulectomia e antibioticoterapia.</p> <p>(B) curetagem e irrigação do alvéolo e administração de antimicrobianos.</p> <p>(C) antibioticoterapia e drenagem cirúrgica.</p> <p>(D) drenagem extra-oral e administração de antimicrobianos.</p> <p>(E) drenagem cirúrgica e irrigação com solução salina.</p>
<p>53. Na avaliação do risco de cárie dentária são considerados fatores negativos:</p> <p>(A) lesões cariosas duras escurecidas.</p> <p>(B) baixo número de <i>Lactobacillus</i>.</p> <p>(C) lesões cariosas moles, com aparência esbranquiçada.</p> <p>(D) CPOD baixo.</p> <p>(E) capacidade tampão normal.</p>	<p>58. Paciente com 21 anos de idade, sexo feminino, apresenta o dente 38 incluso, com indicação de extração cirúrgica. Nesse caso,</p> <p>(A) o controle de placa prévio à cirurgia não é eficaz para reduzir a incidência de alveolite.</p> <p>(B) a pericoronarite aguda não constitui empecilho à realização da cirurgia.</p> <p>(C) a antibioticoterapia prévia à realização da cirurgia não é indicada na presença de pericoronarite.</p> <p>(D) o controle de placa antes da cirurgia é eficaz para reduzir a incidência de alveolite.</p> <p>(E) o controle de placa antes da cirurgia é eficaz para reduzir a incidência de pericoronarite.</p>
<p>54. Paciente com 54 anos de idade, sexo masculino, tem diagnóstico de candidose de grau leve no palato. Deve ser indicada a substituição da prótese total superior e recomendadas medidas de higiene bucal associadas ao uso de bochechos com o antifúngico</p> <p>(A) digluconato de clorexidina.</p> <p>(B) anfotericina B.</p> <p>(C) aciclovir.</p> <p>(D) derivado triazólico.</p> <p>(E) nistatina.</p>	<p>59. Paciente com 11 anos de idade, sexo masculino, relata acidente com traumatismo da face. Clinicamente, observa-se luxação parcial do dente 21 no sentido oclusal, grande mobilidade em sentido horizontal e vertical, e intenso sangramento na região cervical. O dente apresenta-se sensível ao teste de percussão e radiograficamente observa-se aumento do espaço periodontal na região apical. Considere os procedimentos a seguir:</p> <p>I. o reposicionamento do dente deve ser feito através de pressão digital, delicada e contínua, no sentido apical.</p> <p>II. após verificação radiográfica da posição correta do dente, procede-se à fixação rígida por duas a três semanas.</p> <p>III. após verificação radiográfica da posição correta do dente, procede-se à fixação flexível por duas a três semanas.</p> <p>IV. deve-se realizar um alívio das interferências oclusais.</p> <p>V. deve-se realizar o tratamento ortodôntico após o ajuste oclusal.</p>
<p>55. Em exodontias não-complicadas de dentes permanentes, a medicação pós-operatória consiste em administrar uma dose de dipirona ou paracetamol, logo após a intervenção, com o paciente ainda sob o efeito da anestesia local. A contra-indicação ao paracetamol ocorre em paciente que apresente</p> <p>(A) distúrbio hematopoético.</p> <p>(B) disfunção hepática.</p> <p>(C) obstrução intestinal.</p> <p>(D) pressão arterial sangüínea sistólica abaixo de 100 mm Hg.</p> <p>(E) porfiria hepática.</p>	<p>No caso, estão corretos APENAS</p> <p>(A) I, II e III.</p> <p>(B) I, II e V.</p> <p>(C) I, III e IV.</p> <p>(D) II, III e IV.</p> <p>(E) II, IV e V.</p>
<p><u>Instruções:</u> Para resolução das questões de números 56 e 57, considere o enunciado a seguir:</p> <p><i>Paciente com 33 anos de idade, sexo feminino, relata ter realizado extração cirúrgica do dente 18 quatro dias antes desta consulta. A queixa é de dor espontânea, pulsátil e persistente na região do dente removido, irradiando para a região orbitária. A halitose é acentuada. Adicionalmente, a paciente relata o uso de contraceptivos orais. Clinicamente, observa-se que o alvéolo dentário está parcialmente preenchido por material necrótico e circundado por gengiva com sinais de inflamação.</i></p> <p>56. O quadro é compatível com o diagnóstico de</p> <p>(A) alveolite.</p> <p>(B) pericoronarite.</p> <p>(C) pulpite.</p> <p>(D) abscesso pós-cirúrgico.</p> <p>(E) abscesso subperiosteal.</p>	<p>60. Paciente com 22 anos de idade, sexo masculino, tem diagnóstico de pulpite irreversível no dente 37. Após três tentativas de anestesia local por bloqueio do nervo alveolar inferior, o paciente continua a relatar dor. Nessa situação, indica-se a técnica anestésica</p> <p>(A) infiltrativa terminal.</p> <p>(B) infra-orbitária.</p> <p>(C) infiltrativa subperióstica.</p> <p>(D) bloqueio regional mentoniano.</p> <p>(E) intra-óssea.</p>