

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***(PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CORPO
DE SAÚDE DA MARINHA / PS-CSM/2005)***

ENFERMAGEM

- 1) Qual das opções abaixo NÃO apresenta uma das complicações da terapia enteral?
- (A) Diarréia.
 - (B) Embolia gasosa.
 - (C) Atelectasia.
 - (D) Cólicas.
 - (E) Broncoaspiração.
- 2) A vacina tríplice viral, composta de vírus vivos atenuados, confere imunidade contra as seguintes patologias:
- (A) coqueluche, tétano e difteria.
 - (B) caxumba, varicela e tétano.
 - (C) coqueluche, sarampo e tétano.
 - (D) rubéola, tétano e poliomielite.
 - (E) sarampo, caxumba e rubéola.
- 3) A hidratação adequada, a exsanguíneotransfusão e a fototerapia são escolhas de tratamento para a condição de
- (A) disfunção eritrocitária.
 - (B) hiperinsulinemia.
 - (C) posmaturidade.
 - (D) hiperbilirrubinemia.
 - (E) prematuridade.
- 4) Determinar a presença de objetos metálicos no interior do paciente, como, por exemplo, órteses ortopédicas, marcapassos, grampos de aneurisma, D.I.U., é um cuidado de enfermagem considerado fundamental para que exame?
- (A) Tomografia Computadorizada.
 - (B) Eletroneuromiografia.
 - (C) Eletroencefalograma.
 - (D) Ressonância Nuclear Magnética.
 - (E) Cintilografia com gálio.
- 5) Assinale a opção que apresenta a definição de volume corrente.
- (A) Volume de ar inspirado e expirado durante um minuto.
 - (B) Volume de ar que permanece nos pulmões após uma expiração forçada.
 - (C) Volume de ar que é inspirado e expirado normalmente em cada ciclo respiratório.
 - (D) Maior quantidade de ar que pode entrar nos pulmões após uma inspiração normal.
 - (E) Maior quantidade de ar que pode sair dos pulmões após uma expiração normal.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 6) A enfermeira ao avaliar um paciente em utilização de ventilador mecânico observou um aumento na pressão de pico da via aérea. A causa provável do problema é o
- (A) extravazamento no tubo oro traqueal.
 - (B) aumento na complacência do circuito.
 - (C) reflexo da tosse diminuído.
 - (D) broncoespasmo.
 - (E) vazamento em conexões do circuito.
- 7) A publicação que contém a descrição detalhada e seqüencial de como uma atividade deve ser realizada é denominada manual de
- (A) regulamentos.
 - (B) regimentos.
 - (C) normas.
 - (D) rotinas.
 - (E) procedimentos.
- 8) São considerados exemplos de doenças de notificação compulsória:
- (A) AIDS, meningite meningocócica, parotidite e difteria.
 - (B) varicela, difteria, AIDS e sarampo.
 - (C) sarampo, rubéola, meningite meningocócica e varicela.
 - (D) AIDS, rubéola, sarampo e tuberculose.
 - (E) meningite meningocócica, AIDS, sarampo e difteria.
- 9) Baseando-se no que reza a legislação trabalhista sobre férias, assinale a opção correta.
- (A) A concessão de férias será participada ao funcionário com antecedência mínima de noventa dias.
 - (B) A época de concessão de férias será a que melhor atender aos interesses do empregador.
 - (C) Serão concedidas férias após treze meses de vigência do contrato de trabalho.
 - (D) Serão concedidas férias por ato do chefe imediato em um só período de trinta dias, sem exceções.
 - (E) A época de concessão das férias será a que melhor atender aos interesses do trabalhador.
- 10) Assinale a opção que apresenta corretamente uma característica clínica da fibrilação ventricular.
- (A) Perda tardia da consciência.
 - (B) Anóxia cerebral imediata.
 - (C) Pulsos periféricos detectáveis.
 - (D) Pressão arterial audível.
 - (E) Icterícia.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 11) A lavagem das mãos é a principal medida preventiva da "diarréia da creche". Os bebês e crianças pequenas em creches podem apresentar esta patologia devido à infecção pelos seguintes agentes patógenos:
- (A) Shigella, Salmonella, Rotavírus, E. coli e Giardíase.
 - (B) Cândida, Leptospira, Corynebacterium, Bacilo de Klebs e Neisseria.
 - (C) HTLV III, Rickettsia, Nocardia, Paragonimus e Anopheles.
 - (D) Westermani, Schick, Staphylococcus, Clostridium e Trichuris.
 - (E) Proteus, Pseudomonas, Staphylococcus, Aspergillus e Aerogenes.
- 12) No paciente idoso, os transtornos depressivos são uma preocupação significativa para a geriatria, variando de 5 a 10% segundo estimativas norte-americanas. Os sinais e sintomas comuns desses transtornos incluem:
- (A) ideação paranóide, elevada auto-estima e ganho de peso.
 - (B) ideação suicida, aumento do apetite e sentimento de utilidade.
 - (C) elevada auto-estima, hiperatividade e distúrbios do sono.
 - (D) problemas de sono, melancolia e perda de peso.
 - (E) ganho de peso, diminuição do apetite e hiperatividade.
- 13) Durante o atendimento inicial a uma criança com trauma ocular por objeto penetrante, deve-se proceder a seguinte conduta:
- (A) realizar tamponamento com pressão.
 - (B) manter decúbito ventral.
 - (C) manter a cabeça em decúbito horizontal.
 - (D) não remover o objeto penetrante.
 - (E) manter a criança em posição de trendelemburg.
- 14) Os sinais avaliados pela escala de Apgar durante os primeiros cuidados ao recém-nascido devem ser:
- (A) pressão arterial, ventilação, temperatura corpórea, edema periorbital e depressão das fontanelas.
 - (B) frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor.
 - (C) hematúria, relaxamento esfinteriano, calafrio, icterícia e mecônio.
 - (D) hipotermia, hipovolemia, pressão arterial, hipóxia fetal e convulsão.
 - (E) icterícia neonatal, desidratação, sudorese, hipoglicemia e agitação.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 15) Na infusão de concentrados de plaquetas, deve-se observar alguns cuidados muito importantes. Qual das opções abaixo apresenta corretamente um desses cuidados?
- (A) Verificar rigorosamente a identificação do paciente, comparando com a identificação das bolsas.
 - (B) Inspeccionar o produto, desprezando as bolsas que estiverem com o produto turvo.
 - (C) Caso a transfusão não possa ser iniciada de imediato, armazenar o produto por até 48 horas na geladeira do posto de enfermagem.
 - (D) Infundir lentamente em 12 horas.
 - (E) Aquecer o concentrado de plaquetas previamente em banho-maria a uma temperatura de 70°C.
- 16) No paciente portador de insuficiência renal crônica, é frequente a anemia profunda. Dentre as opções abaixo, assinale a que apresenta uma causa correta.
- (A) Baixa produção de eritropoietina pelos rins.
 - (B) Diminuição da filtração glomerular.
 - (C) Retenção de água e sódio.
 - (D) Aumento da produção de hormônio tireoideano.
 - (E) Elevação da taxa de serotonina sérica.
- 17) Coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas afirmações abaixo, referentes ao alcoolismo, assinalando, a seguir, a opção correta.
- () Existe um forte fator genético no desenvolvimento do alcoolismo.
 - () O álcool é extremamente efetivo no alívio da ansiedade.
 - () O álcool é um estimulante do sistema nervoso central.
 - () O álcool é uma droga lícita.
- (A) (F) (F) (V) (F)
 - (B) (F) (F) (F) (F)
 - (C) (V) (V) (F) (V)
 - (D) (V) (F) (V) (F)
 - (E) (V) (V) (V) (V)
- 18) O imunobiológico que contém agentes imunizantes sob forma de bactérias, vírus e agentes infecciosos purificados e/ou modificados é denominado
- (A) antígeno.
 - (B) linfócito.
 - (C) vacina.
 - (D) neutrófilo.
 - (E) anticorpo.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 19) A síndrome da morte súbita infantil é um dos transtornos do trato respiratório que pode acometer o recém-nato. O aumento do risco desta síndrome está relacionado à posição de
- (A) decúbito ventral.
 - (B) decúbito dorsal.
 - (C) fowler.
 - (D) cabeceira a 30°.
 - (E) decúbito lateral direito.
- 20) São sinais e sintomas compatíveis com a ruptura da trompa em caso de gravidez ectópica:
- (A) hipertensão e choque.
 - (B) dor intensa e hipoglicemia.
 - (C) dor intensa e choque.
 - (D) hipertensão e dor.
 - (E) cefaléia intensa e bradipnéia.
- 21) O exame físico e a entrevista com o paciente são elementos de que etapa do processo de enfermagem?
- (A) Implementação.
 - (B) Avaliação.
 - (C) Planejamento.
 - (D) Diagnóstico.
 - (E) Investigação.
- 22) A lidocaína é uma droga utilizada em pacientes cardiológicos para controlar arritmias ventriculares. Das opções abaixo, assinale a que se refere a um efeito colateral dessa droga.
- (A) Insuficiência hepática.
 - (B) Dislalia.
 - (C) Insuficiência renal aguda.
 - (D) Agitação e desorientação.
 - (E) Ideação suicida.
- 23) São consideradas complicações agudas do Diabetes:
- (A) neuropatia e lipodistrofia.
 - (B) síndrome hiperosmolar não cetótica e cetoacidose.
 - (C) doença vascular periférica e síndrome hiperosmolar não cetótica.
 - (D) cetoacidose e lipodistrofia.
 - (E) hipoglicemia e retinopatia.
- 24) É complicação do infarto agudo do miocárdio:
- (A) insuficiência do átrio direito.
 - (B) arritmia.
 - (C) insuficiência da válvula tricúspide.
 - (D) ruptura do átrio direito.
 - (E) ruptura da artéria aorta.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 25) Uma estratégia de Educação e Intervenção na Saúde a fim de diminuir as câibras nos membros inferiores é a orientação da gestante em relação à ingestão adequada de
- (A) sódio.
 - (B) magnésio.
 - (C) proteína.
 - (D) cálcio.
 - (E) óleo mineral.
- 26) Que complicação comum após uma biópsia renal pode aparecer precocemente ou após alguns dias?
- (A) Falência cardíaca.
 - (B) Retenção urinária.
 - (C) Estrangúria.
 - (D) Icterícia.
 - (E) Hemorragia.
- 27) "Em altas doses, pode induzir convulsões e depressão dos centros medulares da respiração, resultando em óbito por parada cardíaca ou respiratória. Freqüentemente, períodos de síncope ou dor torácica precedem a morte".
A afirmativa acima refere-se a uma droga ilícita, que produz intensa euforia, podendo ser utilizada por inalação, injeção intravenosa ou subcutânea e fumada, denominada
- (A) maconha.
 - (B) cocaína.
 - (C) dietilamida do ácido lisérgico.
 - (D) heroína.
 - (E) metadona.
- 28) Nas crianças em idade escolar, o processo patológico resultante de uma reação antígeno-anticorpo (secundária a uma infecção primária), cujo agente etiológico mais comum é o estreptococos beta-hemolítico do grupo A, é denominado
- (A) glomerulonefrite aguda.
 - (B) criptorquidia.
 - (C) extrofia urinária.
 - (D) hipospádia.
 - (E) síndrome nefrótica.
- 29) Qual o efeito colateral da terapia com corticosteróides?
- (A) Hipotensão.
 - (B) Dislalia.
 - (C) Fraqueza muscular.
 - (D) Aumento da massa óssea.
 - (E) Alcalose respiratória.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 30) Durante a aplicação do processo de enfermagem, a condição de desequilíbrio bio-psico-sócio-espiritual do indivíduo denomina-se
- (A) problema de enfermagem.
 - (B) procedimento de enfermagem.
 - (C) procedimento de autocuidado.
 - (D) plano assistencial de enfermagem.
 - (E) prognóstico de enfermagem.
- 31) A manutenção da umidificação adequada durante a ventilação mecânica de uso pediátrico, cujos tubos endotraqueais possuem diâmetro reduzido, tem por objetivo:
- (A) diminuir o volume corrente.
 - (B) calibrar a pressão.
 - (C) manter as secreções liquefeitas.
 - (D) aumentar a resistência da via aérea.
 - (E) diminuir a gasometria.
- 32) Nas primeiras duas a três horas após a punção lombar, para reduzir o extravasamento do líquido e separar o alinhamento das meninges feito pela agulha, o paciente deve ser orientado a permanecer em posição de
- (A) Sims.
 - (B) fowler alto.
 - (C) decúbito ventral.
 - (D) decúbito dorsal.
 - (E) decúbito lateral D ou E, mas com membros inferiores fletidos.
- 33) Assinale a opção que apresenta uma possível ocorrência, posterior à ruptura das membranas fetais, a que o enfermeiro deverá estar atento, durante o trabalho de parto.
- (A) Tromboangeíte.
 - (B) Toxemia gravídica.
 - (C) Perfuração uterina.
 - (D) Involução uterina.
 - (E) Prolapso de cordão umbilical.
- 34) Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas da sentença abaixo.
A colonoscopia é um exame realizado com o paciente em decúbito _____, onde se pode fazer inspeção visual direta do cólon até o _____.
- (A) lateral D / ceco
 - (B) ventral / ceco
 - (C) lateral E / duodeno
 - (D) lateral D / duodeno
 - (E) lateral E / ceco

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 35) Como é denominada a fase do processo de seleção de material hospitalar em que é feita uma comunicação escrita sobre as vantagens e desvantagens apresentadas pelo material e se este está de acordo com as especificações?
- (A) Padronização.
 - (B) Especificação.
 - (C) Controle de qualidade.
 - (D) Parecer técnico.
 - (E) Normatização.
- 36) Dentre as opções abaixo, assinale a que apresenta algumas complicações da hemodiálise.
- (A) Hipertensão arterial, câibras musculares, embolia gasosa e nistagmo.
 - (B) Hipertensão arterial, câibras musculares, dor torácica e sialorréia.
 - (C) Hipotensão arterial, câibras musculares, embolia gasosa e arritmias cardíacas.
 - (D) Hipotensão arterial, câibras musculares, midríase parálitica e alopecia.
 - (E) Dor torácica, hipertensão arterial, exsanguinação e miose.
- 37) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo.
"Durante o processo de diálise peritoneal, quanto _____ for a concentração de glicose, _____ será o gradiente osmótico e _____ a quantidade de água removida."
- (A) maior/maior/maior
 - (B) maior/maior/menor
 - (C) menor/menor/maior
 - (D) menor/maior/maior
 - (E) maior/menor/menor
- 38) O diabetes que se inicia usualmente no jovem (idade menor que trinta anos), com perda de peso recente e presença de anticorpos para as células das ilhotas, é denominado Tipo
- (A) Gestacional.
 - (B) Um.
 - (C) Estável.
 - (D) Lábil.
 - (E) Latente.

- 39) Considerando um paciente internado, em uso de terapia intravenosa, apresentando temperatura elevada, taquicardia, rubor e dor no sítio de inserção da agulha, é correto afirmar que devem estar ocorrendo
- (A) infiltração venosa e embolia.
 - (B) hemorragia e infiltração.
 - (C) flebite e hemorragia.
 - (D) flebite e bacteremia.
 - (E) embolia e hemorragia.
- 40) Qual o método mais utilizado para o planejamento da assistência de enfermagem?
- (A) Processo de enfermagem.
 - (B) Plano operacional de enfermagem.
 - (C) Planejamento escalonado de atividades.
 - (D) Gráfico de Grant.
 - (E) Programa gerencial avançado.
- 41) No paciente submetido à cirurgia torácica, em utilização de drenagem intrapleural, a "ordenha" é necessária para
- (A) controlar a pressão mediastinal.
 - (B) evitar a obstrução do dreno por coágulos e fibrinas.
 - (C) prevenir infecção do pulmão e do mediastino.
 - (D) estimular a diminuição do volume drenado.
 - (E) evitar que líquido reflua para o espaço pleural.
- 42) Como é denominado o distúrbio freqüente em crianças caracterizado pela diminuição da capacidade de transportar oxigênio devido à deficiência de hemoglobina?
- (A) Hemofilia.
 - (B) Anemia.
 - (C) Icterícia fisiológica.
 - (D) Fibrose cística.
 - (E) Eritroblastose.
- 43) Para infundir 500ml de solução glicosada 5% em três horas, em quantas gotas/minuto, aproximadamente, deve ser estabelecido o fluxo?
- (A) 52
 - (B) 54
 - (C) 56
 - (D) 58
 - (E) 60

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 44) História de emagrecimento e alteração de hábitos intestinais, associados a dor abdominal abafada e melena, são sintomas iniciais de
- (A) câncer de cólon D.
 - (B) câncer de reto.
 - (C) câncer de esôfago.
 - (D) pancreatite.
 - (E) hepatite medicamentosa.
- 45) Como são denominadas as contrações intermitentes do útero, palpáveis e indolores que ocorrem em intervalos regulares, mais comumente percebidas depois de 28 semanas de gestação?
- (A) Chadwick.
 - (B) Braxton Hicks.
 - (C) Ballottment.
 - (D) Hegar.
 - (E) Goodell.
- 46) A dosagem de hemoglobina glicosilada é um exame sanguíneo que reflete
- (A) o hematócrito do paciente diabético nas últimas 3 semanas.
 - (B) a glicemia do paciente no momento do exame.
 - (C) os níveis glicêmicos médios durante um período de 2 a 3 meses.
 - (D) limiares renais anormais de glicose.
 - (E) a existência de corpos cetônicos circulantes e cetonúria.
- 47) Na assistência ao paciente portador de leucemia aguda, neutropênico e com trombocitopenia, qual a justificativa para se evitar os procedimentos invasivos?
- (A) Alto risco de necrose local.
 - (B) Baixo risco de infecção.
 - (C) Danos neurológicos irreversíveis.
 - (D) Alto risco de sangramento.
 - (E) Alto risco de embolia pulmonar.
- 48) A sífilis e a leptospirose são patologias transmissíveis e podem ser classificadas como doenças infecciosas causadas por
- (A) vírus.
 - (B) parasitos.
 - (C) fungos.
 - (D) espiroquetas.
 - (E) protozoários.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 49) Um cliente internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital geral apresenta-se taquicárdico, taquipneico com utilização de músculos acessórios da respiração, ansioso e sudoreico. A gasometria arterial mostra PaO₂ de 50mmHg e PaCO₂ de 65mmHg. Com base nos dados acima, é correto afirmar que se trata de um caso de
- (A) hiperglicemia.
 - (B) hemorragia digestiva alta.
 - (C) ansiedade devido à longa permanência na unidade.
 - (D) trombose venosa periférica.
 - (E) insuficiência respiratória aguda.
- 50) Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo, em relação ao acesso periférico para quimioterapia, assinando, a seguir, a opção correta.
- () As veias medianas (basílica e cefálica) são as mais recomendadas para punção por não apresentarem riscos de intercorrências.
 - () Quando se desenvolve um problema na veia utilizada, outra veia mais acima no trajeto pode ser puncionada.
 - () A presença de cicatriz e/ou esclerose não interferem na escolha do local.
 - () É possível a aplicação de calor para distender a veia, facilitando a punção.
- (A) (F) (F) (V) (F)
 - (B) (V) (F) (V) (F)
 - (C) (V) (V) (F) (V)
 - (D) (F) (V) (F) (V)
 - (E) (F) (V) (V) (F)