



# POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Pessoal  
Centro de Recrutamento e Seleção de Praças



## CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO INGRESSO DE NOVOS OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / 2010

### PROVA

| CATEGORIA PROFISSIONAL | ESPECIALIDADE           |
|------------------------|-------------------------|
| <b>ENFERMAGEM</b>      | <b>ENFERMAGEM GERAL</b> |

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:

- Você receberá do fiscal o seguinte material:
  - 01 (UM) **CADERNO DE PROVAS** contendo 55 (CINQUENTA E CINCO) questões, sendo 50 (CINQUENTA) **OBJETIVAS** e 05 (CINCO) **DISCURSIVAS**, e 04 (QUATRO) páginas para serem utilizadas como rascunho.
  - 01 (UM) **CARTÃO-RESPOSTA** destinado à marcação das respostas da prova **OBJETIVA**.
- Verifique se esse material está em ordem; caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas corretas deve ser feita de modo a cobri-las completamente.  
  
*Exemplo:*

|                     |
|---------------------|
| 25. (A) (■) (C) (D) |
|---------------------|
- Utilize caneta esferográfica azul ou preta para marcar as respostas **OBJETIVAS** no **CARTÃO-RESPOSTA** e para responder às questões **DISCURSIVAS**.
- O preenchimento do **CARTÃO-RESPOSTA** com rasuras implicará a perda da questão correspondente; logo, **EVITE RASURAS**.
- Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o dobrar, amassar ou manchar.
- Tenha muito cuidado com o **CADERNO DE PROVAS**, para não o danificar, rasgar ou descaracterizar.
- Para cada uma das questões **OBJETIVAS**, são apresentadas 04 (QUATRO) opções, classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar 01 (UMA) resposta. A marcação em mais de uma opção implicará a perda da questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.
- As questões **DISCURSIVAS** devem ser respondidas no espaço a elas reservado. Não serão corrigidas ou consideradas quaisquer anotações ou respostas que estejam em lugares não destinados para a solução da questão.
- Quando terminar, entregue ao fiscal o **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE PROVAS** devidamente assinados.
- O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTA PROVA É DE 5 (CINCO) HORAS.

### ATENÇÃO

**O NÃO PREENCHIMENTO CORRETO DO CARTÃO-RESPOSTA IMPLICARÁ A PERDA DA QUESTÃO CORRESPONDENTE.**

*Boa Sorte!*

Nome do Candidato:

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <hr/> <p>Assinatura do Candidato</p> |  |
|--------------------------------------|--|

**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Diretoria Geral de Pessoal****Centro de Recrutamento e Seleção de Praças****CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO  
INGRESSO DE NOVOS OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA  
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / 2010****PROVA****CATEGORIA PROFISSIONAL****ESPECIALIDADE****ENFERMAGEM****ENFERMAGEM GERAL****OBJETIVAS****Questão 01**

Na Resolução COFEN 311/2007, as penalidades impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem aos enfermeiros que cometem infração na sua prática podem ser classificadas em leves, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso.

Assinale a alternativa que contém apenas circunstâncias agravantes às infrações cometidas.

- I. Realizar atos sob coação e/ou intimidação.
- II. Realizar ato sob emprego real de força física.
- III. Ter confessado espontaneamente a autoria da infração.
- IV. Cometer infração dolosamente.
- V. Cometer a infração por motivo fútil ou torpe.

- (A) I e IV.
- (B) II e IV.
- (C) II e V.
- (D) IV e V.

**Questão 02**

De acordo com o Decreto N°. 94.406, que regulamenta a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem (N°. 7.498/86), a equipe de enfermagem é composta de profissionais de quatro categorias: enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Segundo essa legislação, essas categorias têm níveis de escolaridade e responsabilidades distintos dentro da equipe de enfermagem, havendo atribuições específicas para cada uma delas.

Assinale a alternativa que contém uma das atribuições específicas do técnico de enfermagem.

- (A) Prestação de assistência de enfermagem a gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido.
- (B) Orientação de pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições médicas.
- (C) Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exigem conhecimentos científicos adequados.
- (D) Acompanhamento da evolução do trabalho de parto, identificando possíveis distócias obstétricas.

**Questão 03**

A lei que dispõe sobre o Exercício Profissional da Enfermagem (N°. 7.498/86) estabelece que a sua equipe está subdividida em quatro categorias profissionais: enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, enumerando as funções pertinentes a cada uma dessas categorias.

Dentre as atividades de enfermagem privativas do enfermeiro, encontra-se:

- (A) Direção de escola, chefia de departamento e coordenação de cursos para formação de pessoal de enfermagem em todos os graus.
- (B) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre a matéria de enfermagem.
- (C) Exercício do magistério nas disciplinas específicas de enfermagem no ensino médio e superior, respeitadas as disposições legais relativas ao ensino.
- (D) Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.

**Questão 04**

Para estar habilitado ao exercício legal da profissão na administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal, do Distrito Federal e dos Territórios, o enfermeiro e todo o pessoal de enfermagem, necessariamente, precisam estar registrados na seguinte entidade de classe:

- (A) Associação Brasileira de Enfermagem.
- (B) Associação dos Servidores Públicos.
- (C) Conselho Regional de Enfermagem.
- (D) Sindicato Regional de Enfermagem.

### Questão 05

Segundo a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº. 8.080/90), são critérios para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios a(o):

- I. eficiência na arrecadação de impostos.
- II. perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- III. participação paritária dos usuários no Conselho de Saúde.
- IV. previsão do plano quinquenal de investimentos da rede.

Estão corretos os itens

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III e IV.
- (D) II e IV.

### Questão 06

O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as três esferas de gestão – União, Estados e Municípios – com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando a alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde.

Ele está dividido em três eixos centrais: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão; estando, dentre as principais modificações trazidas por ele, a substituição do modelo anterior das formas de transferência dos recursos federais para Estados e Municípios, que passou a ser integrada por cinco grandes blocos, a saber:

- (A) Atenção Básica, Atenção da Média Complexidade, Atenção da Alta Complexidade, Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica.
- (B) Atenção Básica, Atenção da Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.
- (C) Atenção Básica, Atenção da Média e Alta Complexidade, Promoção da Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.

- (D) Atenção Básica, Atenção da Média Complexidade, Atenção da Alta Complexidade, Assistência Farmacêutica e Saúde Bucal.

### Questão 07

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.

Visando a sua operacionalização, foram definidas algumas áreas estratégicas para atuação em todo o território nacional, como

- (A) a eliminação da desnutrição infantil e o controle da tuberculose.
- (B) o controle da hipertensão e a ampliação da saúde da família.
- (C) o controle da hanseníase e a saúde do sistema penitenciário.
- (D) a estimulação do controle social e a promoção da saúde.

### Questão 08

Com a ampliação da concepção de saúde e, conseqüentemente, do processo saúde-doença, outras noções também sofreram modificações importantes do ponto de vista conceitual na área da saúde.

Um exemplo disso foi a introdução do termo Vigilância em Saúde, que inclui seis grandes grupos de ações, um dos quais é o da Vigilância Ambiental em Saúde, que é definida como um conjunto de ações que

- (A) proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (B) proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes não biológicos do meio ambiente, com a finalidade de identificar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou agravos à saúde.
- (C) são capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) através de uma ação contínua e sistemática pretendem detectar, conhecer, pesquisar e

analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho.

### Questão 09

Com o objetivo de promover a vacinação da população brasileira e assim diminuir ou até mesmo erradicar várias doenças no território nacional, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, mantém o Programa Nacional de Imunizações (PNI). A partir de 2004, o Ministério da Saúde passou a adotar três calendários obrigatórios de vacinação em todo o território nacional, um dos quais é o Calendário Básico de Vacinação da Criança.

São exemplos de algumas vacinas, obrigatórias no primeiro ano de vida, que fazem parte desse calendário:

- (A) BCG, via intradérmica, 1 dose; Sabin, via oral, 3 doses; Hepatite B, via intramuscular, 3 doses; Tetravalente, via intramuscular, 3 doses; Tríplice viral, via subcutânea, 2 doses.
- (B) BCG, via subcutânea, 1 dose; Sabin, via oral, 3 doses; Hepatite B, via intramuscular, 3 doses; Tetravalente, via intramuscular, 4 doses; Tríplice viral, via subcutânea, 1 dose.
- (C) BCG, via intradérmica, 1 dose; Sabin, via oral, 3 doses; Hepatite B, via intramuscular, 3 doses; Tetravalente, via intramuscular, 3 doses; Tríplice viral, via subcutânea, 1 dose.
- (D) BCG, via intradérmica, 1 dose; Sabin, via oral, 3 doses; Hepatite B, via intramuscular, 3 doses; Tetravalente, via intramuscular, 3 doses; Tríplice viral, via intramuscular, 1 dose.

### Questão 10

Sabe-se que o câncer de colo de útero é uma doença de ação gradativa que se inicia com alterações neoplásicas intraepiteliais (NIC), as quais podem evoluir para um processo invasivo em um período médio de 10 a 20 anos.

Assinale a alternativa correta no que diz respeito à faixa etária de prioridade para coleta do exame preventivo do colo do útero e à orientação quanto à periodicidade do exame, preconizadas pelo Ministério da Saúde.

- (A) 20 a 65 anos, devendo ser repetido anualmente e, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos.
- (B) 25 a 60 anos, devendo ser repetido anualmente e, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos.

- (C) 25 a 65 anos, devendo ser repetido anualmente e, após três exames anuais consecutivos negativos, a cada dois anos.
- (D) 25 a 60 anos, devendo ser repetido anualmente, e, após três exames anuais consecutivos negativos, a cada dois anos.

### Questão 11

As doenças diarreicas e respiratórias persistem como graves problemas para a criança e, quando associadas à desnutrição, colocam em risco a sua vida. Por essa razão, o Ministério da Saúde propôs uma estratégia de abordagem da criança, denominada Atenção às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI). Sendo assim, o AIDPI hoje se constitui numa importante ferramenta de identificação de sinais de risco e qualificação do manejo dos casos.

De acordo com os critérios de abordagem de risco da criança nas unidades de saúde, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa em que todos os itens estão corretos.

- I. Crianças com cartão de vacinação atrasado, prematuras, desnutridas e residentes em áreas de risco constituem o grupo considerado de risco.
  - II. As principais queixas, sinais e sintomas que devem ser verificados são: febre, tosse, coriza, dor de ouvido, vômitos e diarreia.
  - III. Os sinais e sintomas gerais de perigo são: prostração, irritabilidade e agitação intensas, respiração rápida, desidratação, palidez intensa e esforço respiratório.
- (A) I e II.
  - (B) I e III.
  - (C) II e III.
  - (D) I, II e III.

### Questão 12

A infecção pelo vírus da dengue causa uma doença de amplo espectro clínico, incluindo desde formas inaparentes até quadros graves, podendo evoluir para o óbito. Entretanto, independentemente disso, a letalidade pode ser reduzida se o doente for abordado de maneira correta e o serviço de saúde estiver preparado adequadamente, reconhecendo precocemente os sinais de alarme e realizando o monitoramento contínuo do paciente. Um exame físico detalhado também se faz necessário com vista à condução e ao manejo adequado dos pacientes, sendo a prova do laço um procedimento de vital importância para a triagem de pacientes com suspeita de dengue. Nesses casos, ela deve ser realizada obrigatoriamente, pois é a única manifestação hemorrágica de casos complicados ou de febre hemorrágica da dengue, podendo representar a presença de plaquetopenia ou de fragilidade capilar.

O profissional, ao realizar esse teste durante o exame físico do paciente adulto, deverá constatar resultado positivo quando surgirem acima de quantas petéquias no quadrado delimitado para o exame?

- (A) 25.
- (B) 20.
- (C) 15.
- (D) 10.

### Questão 13

No panorama mundial, a Doença de Alzheimer configura-se como uma importante doença crônico-degenerativa, levando à demência, perda de memória progressiva, ausência de controle urinário e intestinal, entre outras manifestações que comprometem a qualidade de vida dos idosos. Ela evolui em três estágios hierárquicos que podem sofrer alterações entre si; são eles: inicial, intermediário e avançado.

No estágio inicial, o idoso pode apresentar

- (A) depressão, hiperatividade, irritabilidade, dificuldade de compreensão, julgamento alterado, perda da noção de risco e comprometimento da realização de tarefas do dia a dia.
- (B) perda de concentração, desatenção, perda de iniciativa, retraimento social, abandono dos passatempos, mudanças de humor e alterações de comportamento.
- (C) desorientação progressiva em relação ao tempo e ao espaço, dificuldade de linguagem, agressividade, questionamentos repetitivos, confusão mental, dificuldade de escrita e, mais raramente, ideias delirantes.
- (D) comprometimento da memória recente, empobrecimento de vocabulário, distúrbios do sono, agitação e perambulação, perseverações, ecolalia e perda da capacidade de executar movimentos e gestos precisos.

### Questão 14

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo, dentre alguns motivos, por ser a mais frequente das doenças cardiovasculares e o principal fator de risco para o acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio e a doença renal crônica terminal, sendo a segunda maior causa de mortalidade no Brasil.

Dentre as ações preconizadas pelo Ministério da Saúde para o controle da HAS, encontra-se o diagnóstico precoce, realizado após diferentes verificações da pressão arterial e com base na classificação da pressão arterial em adultos maiores de 18 anos, segundo a qual se considera um indivíduo com

- (A) pré-hipertensão, aquele que está com PAS entre 120 e 129mmHg e PAD entre 80 e 89mmHg.
- (B) hipertensão no estágio 1, aquele que apresenta PAS entre 140 e 159mmHg e PAD entre 80 e 99mmHg.
- (C) hipertensão no estágio 2, aquele que apresenta PAS maior ou igual a 160mmHg e PAD maior ou igual a 100mmHg.
- (D) hipertensão no estágio 2, aquele que apresenta PAS maior ou igual a 160mmHg e PAD maior ou igual a 110mmHg.

### Questão 15

O Diabetes Mellitus se configura hoje como uma epidemia mundial, sendo um grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. Essa síndrome metabólica apresenta alta morbi-mortalidade, com perda importante da qualidade de vida e é uma das principais causas de insuficiência renal, amputação de membros inferiores, cegueira e doença cardiovascular.

Em relação a Diabetes Mellitus Tipo 2, observe as afirmativas abaixo.

- I. Indivíduos com tolerância à glicose diminuída podem prevenir ou, ao menos, retardar o seu aparecimento com mudanças no estilo de vida: perda de peso, mudanças de padrão alimentar e atividade física regular.
- II. Dentre suas principais complicações crônicas, encontram-se as macrovasculares: doença arterial coronariana, nefropatia e doença cerebrovascular e as microvasculares: neuropatia, retinopatia e doença vascular periférica.
- III. Úlceras de pés e amputação de extremidades são suas complicações mais graves e podem ser prevenidas através das seguintes orientações de enfermagem quanto aos cuidados: exame diário dos pés; uso de sapatos confortáveis, sem meias e nunca andar descalço, mesmo em casa.

Marque a opção que apresenta apenas as afirmativas corretas.

- (A) I.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II e III.

### Questão 16

Alguns pacientes em tratamento de tuberculose podem apresentar efeitos adversos maiores ou menores, que, em sua maioria, requerem condutas que podem ser resolvidas sem maiores comprometimentos.

São exemplos de efeitos adversos menores e maiores, respectivamente:

- (A) febre e hipoacusia.
- (B) artrite e neuropatia periférica.
- (C) exantemas e neurite ótica.
- (D) vasculite e cefaleia.

#### Questão 17

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, de grande importância para a saúde pública devido a sua grande magnitude e a seu alto poder incapacitante, atingindo principalmente a faixa etária economicamente ativa.

A seu respeito, é INCORRETO afirmar:

- (A) Acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também se manifesta como uma doença sistêmica comprometendo articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos.
- (B) Os principais troncos nervosos periféricos acometidos localizam-se na face (trigêmeo e facial); nos braços (radial, ulnar e mediano) e nas pernas (fibular e o tibial).
- (C) O diagnóstico é essencialmente clínico, baseando-se apenas no exame dermatoneurológico, composto por anamnese e teste de sensibilidade.
- (D) O diagnóstico diferencial inclui doenças dermatológicas: pitíriase versicolor, vitiligo, dermatofitoses; e neurológicas: síndrome do túnel do carpo, neuropatias alcoólica e diabética e lesões por esforços repetitivos.

#### Questão 18

A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão sexual ou materno-infantil, sistêmica, de evolução crônica, com períodos de atividade e latência. No caso da transmissão vertical, é denominada sífilis congênita, que, da mesma forma que a sífilis adquirida, se apresenta em dois estágios: o precoce, quando as manifestações clínicas são diagnosticadas até o segundo ano de vida; e o tardio, após esse período.

São sinais e sintomas da sífilis congênita tardia:

- (A) dentes incisivos medianos superiores deformados, surdez e icterícia.
- (B) anemia severa, nariz em sela e fissuras periorificiais.
- (C) fronte olímpica, nariz em sela e mandíbula curta.

- (D) osteocondrite, hidropsia e arco palatino elevado.

#### Questão 19

Os enfermeiros devem estar preparados para elaborar o planejamento do cuidado a partir das manifestações clínicas que os pacientes com HIV/AIDS exibem.

Dentre as alternativas abaixo, assinale a que NÃO corresponde a um problema interdependente para as complicações potenciais que os pacientes podem exibir.

- (A) Infecções oportunistas.
- (B) Insuficiência respiratória.
- (C) Desequilíbrio hidroeletrólítico.
- (D) Plagiocefalia ulcerativa.

#### Questão 20

De acordo com Dolores Little e Doris Carnevali (in George, 1993), a evolução de enfermagem consiste em três passos consecutivos, que representam as mudanças comportamentais do cliente face à ação do profissional de enfermagem.

Assinale a opção que caracteriza a sequência determinada pelas autoras para a evolução no contexto do processo de enfermagem.

- (A) Coleta de evidências, seleção dos critérios e julgamento.
- (B) Seleção dos critérios, coleta de evidências e julgamento.
- (C) Seleção dos critérios, comparação das evidências e julgamento.
- (D) Coleta de evidências, julgamento e registro.

#### Questão 21

Correlacione as Teorias/Modelos de Enfermagem da 1ª coluna com as principais características que se apresentam na 2ª coluna, assinalando a alternativa que corresponde ao preenchimento correto no sentido descendente dos parênteses.

- A. Imogene King
- B. Hildegard Peplau
- C. Madeleine Leininger
- D. Martha E. Rogers
- E. Myra Levine
- F. Sister Callista Roy

- ( ) A Enfermagem é um processo social, interpessoal e pessoal de interação, reação e transação.

- ( ) Busca da independência através das relações interpessoais.
- ( ) A intervenção de enfermagem busca a conservação da energia, integridade estrutural, pessoal e social.
- ( ) O cuidado é cultura, pois cada povo tem seu próprio jeito de cuidar-se.
- ( ) Utiliza os princípios da homeodinâmica que são: complementaridade, helicidade e ressonância.
- ( ) Compreende os processos adaptativos e mal-adaptativos no ser humano.

- (A) A, E, F, B, C, D.
- (B) D, C, B, A, F, E.
- (C) A, B, E, C, D, F.
- (D) D, A, C, E, B, F.

### Questão 22

O exame físico é parte integrante do histórico de enfermagem. Para a realização do exame físico, é necessária a aplicação de técnicas e instrumentos, que seguem, em geral, as etapas: inspeção, palpação, percussão e ausculta.

No que se refere à percussão do tecido pulmonar insuflado em uma pessoa com enfisema, qual será o som esperado?

- (A) Timpanismo.
- (B) Hipеррессонância.
- (C) Ressonância.
- (D) Submacicez.

### Questão 23

A enfermeira ajuda o paciente a assumir a posição adequada no leito e sustenta o corpo no alinhamento correto com travesseiros, evitando deformidades e promovendo conforto.

Dentre as afirmativas relacionadas ao respectivo decúbito, marque a ação INCORRETA.

- (A) Decúbito lateral → Posicionar a perna em posição de discreta abdução.
- (B) Decúbito lateral → Apoiar os pés em dorsiflexão neutra.
- (C) Decúbito ventral → Abduzir e rodar externamente os braços na articulação do ombro.
- (D) Decúbito ventral → Everter os cotovelos.

### Questão 24

Coloque (F) para FALSO e (V) para VERDADEIRO nos parênteses, a partir das afirmativas formuladas para o preparo do corpo após a morte.

Assinale a alternativa que corresponde ao preenchimento correto em ordem descendente dos parênteses.

- ( ) Colocar o corpo na posição supina, com um bom alinhamento, e a cabeça ligeiramente elevada → para prevenir o rigor e o livor mortis da face e tórax.
- ( ) Fechar a boca do paciente, amarrando um lenço da cabeça ao queixo → o rigor mortis pode dificultar o fechamento da boca.
- ( ) Aplicar curativos → para prevenir o relaxamento dos esfíncteres.
- ( ) Limpar o corpo → para dar impressão de respeito e bom trato.
- ( ) Prender uma etiqueta ao corpo já envolto em cobertor → a etiqueta externa é primordial para a identificação no necrotério.

- (A) V, V, F, V, V.
- (B) F, F, F, V, V.
- (C) V, F, F, V, V.
- (D) F, V, V, F, F.

### Questão 25

Numa enfermaria da Clínica Médica do HCPM, o médico prescreveu para o Sr. Ademir 150mg de Amicacina via endovenosa, de 8/8 horas, durante 10 dias. No setor, a enfermeira Valéria dispõe de ampolas de 500mg/2ml. Supondo que o Sr. Ademir fará o tratamento completo dessa prescrição durante sua internação e que a enfermeira Valéria desprezará o conteúdo que restar de cada ampola utilizada, responda:

Qual será o volume total desprezado, em número de ampolas, pela enfermeira Valéria após o término do tratamento do Sr. Ademir?

- (A) 42.
- (B) 21.
- (C) 18.
- (D) 09.

### Questão 26

A conservação da temperatura corporal do recém-nascido é meta para a ação de enfermagem nos berçários. A perda de calor do corpo para objetos sólidos frios no ambiente que não estão em contato direto com o lactente, denomina-se

- (A) evaporação.
- (B) radiação.
- (C) condução.
- (D) convecção.

### Questão 27

Os defeitos cardíacos congênitos classificam-se a partir das características hemodinâmicas que podem desenvolver. A classificação descrita por Wong é:

fluxo sanguíneo pulmonar aumentado ou diminuído, obstrução do fluxo sanguíneo ou fluxo misto.

Assinale, dentre as opções, o defeito congênito relacionado com o fluxo sanguíneo pulmonar diminuído.

- (A) Defeito septal atrial.
- (B) Defeito septal ventricular.
- (C) Defeito do canal atrioventricular.
- (D) Tetralogia de Fallot.

#### Questão 28

A hérnia é uma protusão da porção de órgãos através de uma abertura abdominal.

Assinale a que tipo de hérnia esta descrição se refere: *“Protusão dos conteúdos intra-abdominais, através de um defeito na parede abdominal, lateral ao anel umbilical; nunca há um saco peritoneal”*.

- (A) Hérnia de deslizamento.
- (B) Hérnia umbilical.
- (C) Onfalocele.
- (D) Gastrosquise.

#### Questão 29

A pelve feminina pode variar em tamanho e forma. Essa variação vai determinar o mecanismo do parto, aliado a outros fatores. Essas variações podem ser determinadas pelas características raciais, constituição geral, doenças nutricionais, defeitos de desenvolvimento, traumatismo da espinha, dos ossos pélvicos e das extremidades inferiores. A classificação se baseia no contorno e tamanho do estreito superior da pelve.

Assinale o tipo de pelve que apresenta o formato oval e o maior diâmetro ântero-posterior.

- (A) Ginecoide.
- (B) Androide.
- (C) Antropoide.
- (D) Platipeloide.

#### Questão 30

O tratamento da dor durante o trabalho de parto e o parto são de interesse para a mulher e para a equipe clínica que realiza o atendimento.

Dentre os métodos existentes para analgesia/anestesia regional, assinale a alternativa que indica o tipo de bloqueio que produz um grau elevado de alívio da dor, embora possa retardar o trabalho de parto.

- (A) Paracervical.
- (B) Pudendo.
- (C) Em sela.

(D) Epidural.

#### Questão 31

O Ministério da Saúde lançou, no segundo semestre de 1998, uma ampla campanha relacionada à prevenção do câncer do colo uterino. Essa neoplasia constitui-se em uma importante questão de saúde pública, não só por sua frequência e gravidade, mas pela disponibilidade de medidas preventivas e de baixo custo para seu controle, que são basicamente os exames clínico-ginecológicos e a citologia oncológica (Papanicolau). O estágio da lesão do colo uterino pode ser determinado de acordo com a Classificação Internacional do Carcinoma do Colo Uterino.

Qual é a classificação do estágio que se refere ao carcinoma que se estende além do colo sem invasão da parede pélvica?

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.

#### Questão 32

Das alternativas apresentadas, qual está indicada para o tratamento da Síndrome da Abstinência de Alcool?

- (A) Sedação.
- (B) Repouso em quarto escuro.
- (C) Hipohidratação.
- (D) Dieta hipoproteica.

#### Questão 33

Os ferimentos por arma de fogo tornaram-se eventos comuns na prática hospitalar de emergência. O enfermeiro deve estar atento para uma análise da ferida por arma de fogo, para proceder ao registro fidedigno do evento.

Coloque (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS e assinale a alternativa que indica o preenchimento correto dos parênteses no sentido descendente.

- ( ) Quando o projétil atinge o corpo humano, sua energia cinética afasta os tecidos de sua trajetória.
  - ( ) As armas de baixa velocidade podem não provocar lesões letais.
  - ( ) O indivíduo baleado utilizando colete à prova de balas deve ser avaliado quanto à contusão cardíaca.
  - ( ) A ferida estreladal apresenta bordas irregulares e indica que o orifício de saída é menor.
  - ( ) A cavidade temporária tem pressão interna maior que a atmosférica.
- (A) V, F, V, F, F.

- (B) V, V, F, F, F.
- (C) F, V, F, V, V.
- (D) F, F, V, V, V.

#### Questão 34

A inalação de gases superaquecidos pode causar obstrução alta de vias aéreas.

Dentre as alterações precoces apresentadas por um paciente com suspeita de lesão térmica de via aérea superior, aponte aquela que deve ser considerada pelo enfermeiro no atendimento pré-hospitalar.

- (A) Escarro carbonáceo.
- (B) Estridor.
- (C) Convulsões.
- (D) Visão diminuída.

#### Questão 35

Dentre as alterações hidroeletrólíticas que ocorrem no paciente portador de queimadura na fase aguda, destaca-se a(o)

- (A) hemoconcentração.
- (B) hematócrito aumentado.
- (C) débito urinário aumentado.
- (D) fluxo sanguíneo renal diminuído.

#### Questão 36

O tratamento da Necrólise Epidérmica Tóxica envolve cuidados de enfermagem essenciais.

Assinale a alternativa que corresponde a um desses cuidados.

- (A) Observar lentificação da fala.
- (B) Prevenção das complicações oftálmicas.
- (C) Prevenção da hipertermia.
- (D) Controlar as convulsões.

#### Questão 37

Existem vários distúrbios hidroeletrólíticos que podem acometer os clientes com doença renal. O enfermeiro deve avaliar precoce e continuamente esses clientes para detectar as manifestações de tais distúrbios.

Diante dessa afirmativa, quais são as manifestações presentes no cliente com déficit de magnésio?

- (A) Espasmos dos músculos faciais.
- (B) Rubor facial.
- (C) Sonolência.
- (D) Depressão respiratória.

#### Questão 38

Assinale os efeitos raquimedulares na Síndrome de Brown-Séquard (síndrome medular lateral), decorrentes de uma lesão por faca ou projétil, fratura-luxação de um processo articular unilateral ou disco agudamente rompido.

- (A) Perda ipsilateral do tato, pressão e vibração e perda contralateral da dor e temperatura.

- (B) Déficits motores e disfunção intestinal variáveis.
- (C) Perda da sensibilidade a dor, temperatura e função motora.
- (D) As sensações de toque suave, posição e vibração permanecem preservadas.

#### Questão 39

Dentre as modalidades não cirúrgicas de tratamento e cuidado de enfermagem empregadas ao cliente com varizes esofágicas hemorrágicas, marque a opção que associa INCORRETAMENTE a modalidade de tratamento com a prioridade de enfermagem para a mesma.

- (A) Escleroterapia por injeção → Observação da recidiva do sangramento depois do tratamento.
- (B) Lavagem da sonda com soro fisiológico → Garante a permeabilidade da sonda nasogástrica.
- (C) Tamponamento por balão → Evita a obstrução da via aérea e aspiração.
- (D) Administração de propanolol/nadolol → Aumenta a resposta cardiovascular à hemorragia.

#### Questão 40

De acordo com a coloração da urina do paciente internado em uma Unidade de Clínica Médica, o enfermeiro pode detectar alterações importantes.

Indique a opção que faz a correlação correta entre a coloração e a causa possível da mesma.

- (A) Incolor a pálida → Uso de diurético, diabetes e doença renal.
- (B) rósea a vermelha → Menstruação, uso de rifampicina e cirurgia de bexiga.
- (C) Laranja a âmbar → Desidratação, consumo de álcool e glicosúria.
- (D) Marrom a preta → Uso de metronidazol, presença de eritrócitos antigos e melanina.

#### Questão 41

As lesões cutâneas são as características mais proeminentes das condições dermatológicas. Elas variam em tamanho, formato e etiologia, podendo ser classificadas em primárias e secundárias.

Assinale a opção em que a correlação entre o tipo de lesão, a manifestação cutânea e a doença sistêmica é feita da forma correta.

- (A) Escamas → Flocos primários ao epitélio morto descamado → Psoríase.
- (B) Petéquia → Lesão macular arredondada ou irregular → Fragilidade vascular.
- (C) Vesícula → Massa palpável maior que 0,5cm → Rubéola.
- (D) Manchas café com leite → Manchas maculares → Neurofibromatose.

#### Questão 42

As lesões por queimadura são descritas de acordo com a profundidade e extensão da área de superfície corporal. A zona da lesão por queimadura que apresenta aporte sanguíneo comprometido, inflamação e lesão tecidual, de acordo com Brunner, é denominada:

- (A) de coagulação.
- (B) de estase.
- (C) de hiperemia.
- (D) interna.

#### Questão 43

Em relação à fisiopatologia da Doença de Parkinson, destacam-se alguns fatores que ampliam a ocorrência de tremores, rigidez e bradicinesia.

Complete os parênteses com (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS e assinale a alternativa que corresponde ao preenchimento correto em ordem descendente dos parênteses.

- ( ) Destruição das células neuronais dopaminérgicas na substância negra nos gânglios da base.
  - ( ) Depleção das reservas de noradrenalina.
  - ( ) Degeneração da via nigroestriada dopaminérgica.
  - ( ) Desequilíbrio dos neurotransmissores excitatórios (dopamina) e inibitórios (acetilcolina) no corpo estriado.
  - ( ) Comprometimento dos tratos piramidais que controlam os movimentos corporais complexos.
- (A) V, F, F, V, F.
  - (B) V, V, F, F, F.
  - (C) F, V, V, F, F.
  - (D) V, F, V, F, F.

#### Questão 44

O processo decisório envolve a programação e o controle da implementação das ações a partir de alternativas disponíveis. Existem três tipos de classificação para a fase da escolha dessas alternativas.

A classificação da decisão intermediária é dada para a escolha que

- (A) é pressionada pelos subordinados.
- (B) é de natureza executiva.
- (C) reflete a inadequação da estrutura administrativa.
- (D) rompe com os padrões vigentes.

#### Questão 45

A distribuição de pessoal de enfermagem para efetivação da assistência requer conhecimento da clientela, da equipe e dos recursos de que se dispõe.

A partir dessa afirmativa, assinale a opção que indica uma recomendação para elaboração de escala mensal.

- (A) Ressaltar os domingos e feriados na escala.
- (B) Anotar o número de folgas que o funcionário venha a possuir na margem esquerda.
- (C) Buscar o equilíbrio da escala quanto à qualificação profissional dos funcionários.
- (D) Determinar o retorno dos funcionários ao trabalho a partir das ausências de outros.

#### Questão 46

A Resolução COFEN nº 293/2004 estabeleceu os parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de Enfermagem nas Unidades Assistenciais das Instituições de Saúde e assemelhados. Para efeito de cálculo, utiliza-se o quadro de profissionais de Enfermagem determinado pela Lei nº 7.498/86, para as 24 horas da cada Unidade, o sistema de classificação de pacientes, as horas de assistência de enfermagem, os turnos e a proporção funcionário/leito.

Qual é a alternativa que aponta o número de horas de Enfermagem na assistência semi-intensiva?

- (A) 5,6
- (B) 9,4
- (C) 13,8
- (D) 17,9

#### Questão 47

O ponto essencial para a organização de processo seletivo é o diagnóstico do perfil profissional.

Assinale a alternativa correta sobre as fases de recrutamento e seleção de membros da equipe de enfermagem.

- (A) O processo seletivo é reflexo da política dos hospitais, aplicando procedimentos burocráticos.
- (B) O diagnóstico situacional do processo seletivo deve fundamentar-se nas necessidades da organização.
- (C) O perfil profissional é construído e ajustado apenas pelas exigências do mercado de trabalho.
- (D) Ao contratar um profissional, todas as competências desejáveis devem estar presentes.

#### Questão 48

No contexto dos recursos físicos e ambientais, situa-se o do gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a ANVISA definiram uma classificação para melhor organizar o manejo e o destino final.

A que se refere a classificação do grupo A3 da RDC 33 da ANVISA?

- (A) Bolsas contendo sangue ou hemocomponentes com volume residual superior a 50ml.
- (B) Kits de linhas arteriais endovenosas e dialisadores, quando descartados.
- (C) Objetos e instrumentos contendo protuberâncias rígidas e agudas.
- (D) Peças anatômicas do ser humano em valor científico ou legal.

#### Questão 49

Historicamente, no Brasil, o Controle das Infecções Hospitalares teve seu marco referencial com a Portaria MS nº. 196/1993, que instituiu a implantação de Comissões de Controle de Infecções Hospitalares em todos os hospitais do país, independente de sua natureza jurídica. Quanto às normas de biossegurança dos profissionais de saúde, existem protocolos de procedimentos recomendados quando da ocorrência de acidentes de trabalho com exposição ao sangue e outros fluidos potencialmente contaminados. Os procedimentos recomendados em caso de exposição ao material biológico incluem cuidados locais na área exposta, imunização contra o tétano, quimioprofilaxia para hepatite B e HIV e acompanhamento sorológico para o HIV e para o vírus das hepatites B e C.

Todas as medidas abaixo estão corretas, EXCETO:

- (A) Em caso de exposição percutânea, deve-se fazer lavagem exaustiva com água e sabão e em caso de exposição em mucosas, com água ou soro fisiológico a 0,9%.

- (B) Se a profissional de saúde estiver grávida ou amamentando, é contraindicada a administração da Imunoglobulina hiper-imune contra Hepatite B (IGHAHB).
- (C) A quimioprofilaxia para o HIV deve ser iniciada o mais rápido possível, idealmente, até duas horas após o acidente e no máximo em setenta e duas horas.
- (D) O profissional que teve exposição ocupacional ao HIV, até que seja definitivamente liberado, deverá ser orientado a usar preservativos durante as relações sexuais e evitar a gravidez e o aleitamento materno.

#### Questão 50

A Auditoria em Enfermagem agrega elementos essenciais para o levantamento de informações sobre a instituição e o trabalho das equipes. No que se refere à forma de intervenção, ela pode ser conduzida por um elemento não pertencente à instituição, contratado para esse fim.

Assinale o termo utilizado para essa classificação de auditoria.

- (A) Interna.
- (B) Externa.
- (C) Total.
- (D) Contínua.













Rascunho

*Rascunho*

Rascunho

Rascunho

Rascunho