

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***(PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CORPO
AUXILIAR DE PRAÇAS DA MARINHA / PS-CAP/2005)***

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

- 1) O aparecimento de hipertensão arterial acompanhada de proteinúria em gestação acima de 20 semanas, podendo ou não haver edema, são sinais característicos de que patologia?
- (A) Doença renal crônica.
 - (B) Hipertensão arterial crônica.
 - (C) Doença renal aguda.
 - (D) Eclâmpsia.
 - (E) Pré-eclâmpsia.
- 2) Uma vítima de acidente automobilístico foi atendida no setor de emergência de um hospital geral apresentando edema, dor, deformidade e crepitação no terço médio do braço esquerdo. Esse quadro clínico sugere o diagnóstico de
- (A) entorse.
 - (B) estiramento.
 - (C) contusão.
 - (D) fratura.
 - (E) luxação.
- 3) A digoxina é uma medicação prescrita no tratamento da insuficiência cardíaca. Um cuidado básico, que se deve ter antes de administrar a medicação, é
- (A) verificar a pressão venosa central.
 - (B) realizar um ECG do paciente.
 - (C) verificar o pulso radial.
 - (D) verificar a temperatura axilar.
 - (E) verificar a glicemia capilar.
- 4) Um recém-nascido completa um mês de vida e é levado ao posto de saúde pela mãe para iniciar vacinação. De acordo com o calendário de vacinação, que vacinas o auxiliar de enfermagem deverá administrar na criança?
- (A) BCG e Antipólio.
 - (B) Hepatite e Antipólio.
 - (C) DPT e Antipólio.
 - (D) BCG e Hepatite.
 - (E) BCG e DPT.
- 5) Em Unidades de Terapia Intensiva, é comum a internação de pacientes vítimas de traumatismos crânio-encefálicos, submetidos à monitorização de pressão intracraniana. Assinale a alternativa correspondente a um dos cuidados preconizados para estes pacientes.
- (A) Manter a cabeça com a posição reta em relação ao corpo.
 - (B) Aquecer o paciente para estimular aumento da temperatura e metabolismo cerebral.
 - (C) Flexionar bem os membros do paciente.
 - (D) Nunca realizar aspiração de vias aéreas.
 - (E) Monitorizar diurese a cada 24 horas.

Prova : Amarela
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : PS-CAP

- 6) Qual a melhor opção de local para aplicação de medicação intramuscular, em crianças menores de três anos de idade?
- (A) Região vasto-lateral externa.
 - (B) Dorso-glúteo.
 - (C) Face antero-lateral da perna.
 - (D) Região deltóide.
 - (E) Face interna da coxa.
- 7) Na assistência de enfermagem a crianças acometidas por pneumonias, é correto afirmar que
- (A) a oxigenioterapia só é feita através de nebulizações.
 - (B) mesmo em desconforto respiratório, a criança deve ser alimentada por via oral.
 - (C) não é necessário realizar higiene oral, nem aspirar vias aéreas rotineiramente.
 - (D) quanto menor a criança, maior sua necessidade de aquecimento.
 - (E) a criança deve ser mantida em decúbito dorsal com a cabeça a zero graus.
- 8) Para um paciente com prescrição de 1000 ml de solução fisiológica à 0,9%, em um período de 12 horas, o fluxo, em gotas por minuto, será aproximadamente,
- (A) 07
 - (B) 14
 - (C) 28
 - (D) 35
 - (E) 42
- 9) Um paciente, internado em Hospital Psiquiátrico, refere ouvir "vozes", apresentando alucinações e mania de perseguição. De acordo com estes transtornos, pode-se dizer que se trata de um caso de
- (A) Neurose fóbica.
 - (B) Epilepsia.
 - (C) Esquizofrenia.
 - (D) Hemiplegia.
 - (E) Hemiparesia.
- 10) O choque é uma das mais sérias complicações pós-operatórias. Assinale a opção que caracteriza um sinal clássico de choque.
- (A) Respiração eupneica.
 - (B) Pulso rápido e fino.
 - (C) Pele e mucosas normocoradas.
 - (D) Pressão sanguínea alta.
 - (E) Normotermia.

Prova : Amarela
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : PS-CAP

- 11) Assinale a opção que apresenta um cuidado específico na assistência de enfermagem a um recém-nascido em fototerapia.
- (A) Manter o recém-nascido em decúbito dorsal.
 - (B) Manter o recém-nascido em decúbito ventral.
 - (C) Realizar a higienização da pele.
 - (D) Realizar alimentação por gavagem.
 - (E) Manter o recém-nascido com proteção ocular.
- 12) Tosse e expectoração, febre vespertina de baixa intensidade, dores torácicas, emagrecimento, sudorese noturna e escarros com estrias de sangue, constituem a sintomatologia da
- (A) pneumonia.
 - (B) difteria.
 - (C) coqueluche.
 - (D) raiva.
 - (E) tuberculose.
- 13) Coloque V(verdadeiro) ou F(falso), nas opções abaixo, em relação aos cuidados de enfermagem com o paciente diabético, assinalando, a seguir, a opção correta.
- () Verificar a glicemia capilar antes das refeições.
 - () Administrar dieta hipoglicídica conforme prescrição.
 - () Fazer a insulina intra-muscular, observando o rodízio dos locais de aplicação.
 - () Os locais principais para aplicação de insulina são: braços, coxas, quadris e abdome.
 - () Estar atento para os sinais de hipoglicemia, tais como: anorexia, náuseas, vômitos e hálito cetônico.
- (A) (F) (V) (V) (V) (F)
 - (B) (V) (V) (F) (F) (V)
 - (C) (V) (F) (F) (V) (V)
 - (D) (F) (V) (V) (F) (F)
 - (E) (V) (V) (F) (V) (F)
- 14) A vacina que protege contra a coqueluche é
- (A) DPT.
 - (B) SABIN.
 - (C) DT.
 - (D) BCG.
 - (E) Hib.

Prova : Amarela
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : PS-CAP

- 15) A Hanseníase caracteriza-se pelo aparecimento de
- (A) febre moderada a alta, coriza, lacrimejamento, tosse e exantema.
 - (B) máculas acastanhadas ou pretas não-descamativas, mais freqüentes nas regiões palmares.
 - (C) astenia, mialgia, calafrios, febre alta intermitente e sudorese profusa.
 - (D) mácula hipocrômica, única ou em pequenos grupos, com hipoestesia, localizada na face, nos membros ou no tronco.
 - (E) máculas hipocrômicas e acastanhadas, com descamação, predominantes no tronco e na face.
- 16) Assinale a opção em que o artigo hospitalar deverá ser esterilizado em Óxido de etileno.
- (A) Fios do tipo catgut.
 - (B) Seringas de vidro.
 - (C) Bandejas e cubas em aço.
 - (D) Instrumentos metálicos.
 - (E) Roupas.
- 17) Um hospital destinado a prestar assistência sanitária a doentes, nas quatro especialidades básicas, é denominado
- (A) beneficente.
 - (B) geral.
 - (C) especializado.
 - (D) filantrópico.
 - (E) oficial.
- 18) A retenção urinária ocorre com mais freqüência no pós-operatório imediato da cirurgia de
- (A) tireoidectomia.
 - (B) hemorroidectomia.
 - (C) facectomia.
 - (D) mamoplastia.
 - (E) blefaroplastia.
- 19) Assinale a opção em que a terminologia NÃO está corretamente caracterizada.
- (A) Descontaminação prévia: exposição de artigo contaminado à produto químico, antes da limpeza.
 - (B) Desinfecção: destruição de microorganismos patogênicos ou não, situados fora do organismo.
 - (C) Esterilização: destruição ou eliminação de todos os microorganismos.
 - (D) Autoclave: esterilização através do calor seco.
 - (E) Degermação: remoção ou redução do número de bactérias na pele.

Prova : Amarela
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : PS-CAP

- 20) Uma paciente, que vai ser submetida a uma curetagem uterina, deve ser colocada na posição.
- (A) trendelemburg.
 - (B) litotomia.
 - (C) sim's.
 - (D) genupeitoral.
 - (E) fowler.
- 21) Um determinado paciente de sessenta anos, chega à Unidade de Emergência ansioso com dispnéia intensa, apresentando tosse com expectoração rósea, cianose de extremidades e pressão arterial de 180X120mmHg. Os sinais e sintomas indicam presença de
- (A) obstrução Intestinal.
 - (B) sepseemia.
 - (C) acidente Vascular Cerebral.
 - (D) edema Agudo de Pulmão.
 - (E) hemorragia Digestiva.
- 22) Assinale a opção INCORRETA em relação à execução da técnica do curativo simples.
- (A) Curativos sujos não devem ser removidos com as mãos sem luvas.
 - (B) Todos os curativos de ferida devem ser aplicados com luva estéril.
 - (C) As gazes sujas, após a conclusão do curativo, são descartadas no lixo comum do quarto do paciente.
 - (D) Deve-se registrar, ao término do procedimento, o estado do curativo e as condições da ferida.
 - (E) Deve-se aplicar o esparadrapo no centro do curativo e pressioná-lo para baixo em ambos os lados.
- 23) Um auxiliar de enfermagem, ao preparar um paciente para uma lavagem intestinal, deve colocá-lo na posição
- (A) trendelemburg.
 - (B) litotomia.
 - (C) genupeitoral.
 - (D) Sim's.
 - (E) fowler.
- 24) A eliminação de fezes escuras, indicando sangramento do trato gastrointestinal superior, é denominada
- (A) enterorragia.
 - (B) melena.
 - (C) hematêmese.
 - (D) colúria.
 - (E) metrorragia.

Prova : Amarela
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : PS-CAP

- 25) Uma das finalidades do preparo do paciente para a cirurgia é
- (A) deixar a unidade pronta para receber o paciente após a cirurgia.
 - (B) destruir todos os germes que possam levar o paciente a adquirir uma infecção.
 - (C) levar ao conhecimento do paciente todas as seqüelas graves que a cirurgia pode acarretar.
 - (D) proporcionar ao paciente um período tranqüilo, omitindo-lhe inclusive, o tipo de cirurgia a que será submetido.
 - (E) garantir, além de uma recuperação pós-operatória mais rápida, a redução das complicações.
- 26) Foram prescritos 500mg de Thiopental para sedação de um paciente internado na UTI. No posto de enfermagem, estão disponíveis apenas frascos de 1g. Ao diluir o conteúdo do frasco com 8ml de água destilada, quantos mililitros devem ser aspirados para se obter a dose prescrita?
- (A) 3
 - (B) 4
 - (C) 4,5
 - (D) 5
 - (E) 6
- 27) A gestante não vacinada deverá ser imunizada com três doses do Toxóide-tetânico. Qual o intervalo mínimo em dias, recomendado entre as doses?
- (A) 15
 - (B) 20
 - (C) 30
 - (D) 45
 - (E) 60
- 28) No registro das anotações de enfermagem, o auxiliar de enfermagem deve
- (A) manter espaço em branco entre o ponto final e a assinatura.
 - (B) utilizar caneta na cor vermelha para anotações do plantão diurno.
 - (C) realizar as anotações somente no final do plantão.
 - (D) para retificar erros, utilizar a palavra digo entre vírgulas.
 - (E) ao iniciar a anotação usar sempre o termo paciente.

- 29) O descolamento, a descida e a expulsão da placenta para fora das vias genitais é denominado
- (A) insinuação.
 - (B) delivramento.
 - (C) apresentação.
 - (D) coroamento.
 - (E) expulsão.
- 30) Imobilidade, umidade, deficiência nutricional, rugas no lençol e deformidades no colchão são fatores que proporcionam, ao paciente, o surgimento de
- (A) infecções hospitalares.
 - (B) posições viciosas.
 - (C) tendinites e entorses.
 - (D) bursites.
 - (E) úlceras de pressão.
- 31) Um auxiliar de enfermagem ao verificar os sinais vitais de um cliente, numa enfermaria de clínica médica, encontrou os seguintes valores: P = 104 bpm, Tax = 36,8°C, R = 17 ipm e PA = 150 x 95 mmHg. De acordo com estes valores, é correto afirmar que o cliente encontra-se
- (A) normocárdico, normotérmico, eupneico e hipertenso.
 - (B) bradicárdico, hipotérmico, taquipneico e normotenso.
 - (C) normocárdico, afebril, dispneico e hipotenso.
 - (D) taquicárdico, normotérmico, eupneico e hipertenso.
 - (E) taquicárdico, hipertérmico, eupneico e normotenso.
- 32) Uma das atribuições e responsabilidades do profissional de enfermagem na enfermaria, psiquiátrica, é
- (A) promover a segurança do paciente.
 - (B) atender todas as solicitações dos pacientes.
 - (C) aplicar o eletrochoque
 - (D) ser autoritário com os pacientes
 - (E) manter os pacientes restritos ao leito.
- 33) Qual entidade de classe que tem como objetivo principal promover junto aos profissionais de enfermagem o aprimoramento científico-cultural?
- (A) COFEN.
 - (B) COREN.
 - (C) Sindicato dos Enfermeiros.
 - (D) ABEN.
 - (E) Sindicato dos Profissionais de Enfermagem.

Prova : Amarela
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : PS-CAP

- 34) Qual das substâncias abaixo, é produzida no epitélio alveolar do bebê nos últimos meses da gestação com a função de manter os alvéolos inflados?
- (A) Secreção catarral.
 - (B) Colostro.
 - (C) Surfactante.
 - (D) Adrenalina.
 - (E) Mecônio.
- 35) É correto afirmar com relação aos cuidados preconizados no atendimento inicial do paciente em parada cardio-respiratória.
- (A) posicionamento do paciente posição de fowler.
 - (B) abertura das vias aéreas por flexão da cabeça.
 - (C) ventilação do paciente.
 - (D) realização de cateterismo nasogástrico.
 - (E) passagem de catéter vesical.
- 36) Em relação aos cuidados de enfermagem a pacientes com dreno de tórax, é INCORRETO afirmar que deve-se
- (A) verificar a permeabilidade do dreno pelo menos duas vezes ao dia.
 - (B) anotar o volume drenado, mantendo em seguida o frasco vazio.
 - (C) manter o frasco de drenagem abaixo do nível do tórax.
 - (D) trocar o curativo do dreno diariamente e sempre que necessário.
 - (E) fixar o tubo de borracha, com certa folga, ao leito do paciente.
- 37) Em relação às alterações da temperatura corporal, é correto afirmar que
- (A) nas condições de sono e repouso o metabolismo é menor e a temperatura aumenta.
 - (B) a taxa de metabolismo do recém-nascido favorece à diminuição da temperatura.
 - (C) indivíduos desnutridos, geralmente apresentam temperatura mais baixa.
 - (D) o ciclo menstrual, na fase de evolução, abaixa a temperatura.
 - (E) 35.° a 38.°C, são variações normais de temperatura axilar.

- 38) Qual o principal método de diagnóstico da Tuberculose pulmonar?
- (A) Pesquisa de BAAR.
 - (B) Pesquisa de PPD.
 - (C) Biopsia pulmonar.
 - (D) Pesquisa de bactérias gram-positivas.
 - (E) Hemoculturas.
- 39) O Sarampo é uma doença viral altamente contagiosa e a sua transmissão se dá por meio de
- (A) fezes e urina.
 - (B) sangue e liquor.
 - (C) secreções de vias aéreas.
 - (D) erupções cutâneas.
 - (E) escamações da pele.
- 40) A transmissão da AIDS NÃO ocorre através de
- (A) relações sexuais.
 - (B) via oral-fecal.
 - (C) transfusão de sangue.
 - (D) material perfuro-cortante contaminado.
 - (E) gestante portadora para o feto.
- 41) A via utilizada para administração da vacina BCG é a
- (A) subcutânea.
 - (B) intradérmica.
 - (C) oral.
 - (D) muscular.
 - (E) endovenosa.
- 42) Em relação à limpeza da unidade do paciente, é correto afirmar que a
- (A) terminal é aquela feita diariamente.
 - (B) concorrente é aquela feita por ocasião da alta do paciente.
 - (C) terminal e concorrente possuem as mesmas indicações.
 - (D) concorrente é aquela feita por ocasião do óbito do paciente.
 - (E) terminal é aquela feita por ocasião da transferência do paciente.
- 43) A vacina tríplice viral resulta da combinação de vírus vivos de quais doenças?
- (A) Sarampo, Rubéola e Caxumba
 - (B) Hepatite, Sarampo e Rubéola
 - (C) Poliomielite, Varicela e Rubéola
 - (D) Sarampo, Caxumba e Febre Amarela
 - (E) Poliomielite, Caxumba e Febre Amarela

Prova : Amarela
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : PS-CAP

- 44) A vacina antipólio é aplicada no primeiro ano de vida em três doses. A dose de reforço deverá ser dada à criança com quantos meses de idade?
- (A) 13
 - (B) 14
 - (C) 15
 - (D) 16
 - (E) 18
- 45) Na meningite meningocócica, o isolamento deve ser mantido até 48 horas após o
- (A) exame do líquido cefalorraquidiano.
 - (B) primeiro sintoma da doença.
 - (C) aparecimento da rigidez de nuca.
 - (D) início do tratamento específico.
 - (E) aparecimento de crise convulsiva.
- 46) Assinale F(Falso) ou V(Verdadeiro) nas afirmações abaixo, em relação ao paciente cirúrgico, e, em seguida, assinale a opção correspondente à seqüência correta.
- () O paciente que apresenta alterações do estado emocional, poderá ter comprometimento na evolução pós operatória.
 - () Alterações no equilíbrio hidroeletrolítico não contra-indicam a realização de cirurgia.
 - () A prioridade do paciente no período trans-operatório é o preparo do material utilizado na cirurgia.
 - () De acordo com o grau de urgência das cirurgias elas podem ser classificadas em: de emergência, eletiva e opcional.
- (A) (V) (F) (V) (V)
 - (B) (V) (F) (F) (V)
 - (C) (F) (F) (V) (F)
 - (D) (F) (V) (F) (V)
 - (E) (V) (V) (F) (F)
- 47) Assinale a opção que indica sinais e sintomas de certeza da gravidez.
- (A) Amenorréia e aumento do volume abdominal.
 - (B) Aumento do volume uterino e ausculta dos batimentos cardíofetais.
 - (C) Aumento do volume abdominal e palpação dos seguimentos fetais.
 - (D) Aumento do volume uterino e abdominal.
 - (E) Ausculta dos batimentos cardíofetais e movimentação ativa do concepto.

Prova : Amarela
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : PS-CAP

- 48) Em relação à administração de dieta por sonda nasointestinal, assinale a opção correta.
- (A) A dieta deve ser administrada através de um acesso venoso profundo.
 - (B) Durante a administração da dieta, deve-se manter o paciente em decúbito dorsal (zero grau).
 - (C) Deve-se iniciar a administração da dieta, após confirmação do posicionamento da sonda, através de ausculta abdominal.
 - (D) Deve-se iniciar a administração da dieta, imediatamente, após retirá-la da geladeira.
 - (E) Deve-se iniciar a administração da dieta, após confirmação do posicionamento da sonda, através de RX.
- 49) Em um recém-nascido, quando foi verificado o pulso, este era de cento e trinta e dois batimentos por minuto. Esta frequência é considerada
- (A) normocardia.
 - (B) bradicardia.
 - (C) taquicardia.
 - (D) taquisfigmia.
 - (E) bradisfigmia.
- 50) São fatores que afetam a cicatrização normal, EXCETO
- (A) nível nutricional.
 - (B) idade.
 - (C) presença de edema.
 - (D) condições de vascularização.
 - (E) hipercolesterolemia.