

**MARINHA DO BRASIL**  
**DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA**

***(PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CORPO  
AUXILIAR DE PRAÇAS DA MARINHA / PS-CAP/2008)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE  
MATERIAL EXTRA**

**TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

- 1) No Choque Hipovolêmico, líquidos intravenosos são infundidos a uma velocidade rápida até que a pressão arterial ou a PVC (Pressão Venosa Central) suba a um nível satisfatório, ou que o paciente melhore sua condição clínica. A solução utilizada inicialmente é
- (A) Glicose a 5%.
  - (B) Dopamina.
  - (C) Bicarbonato.
  - (D) Amiodarona.
  - (E) Ringer.
- 2) A dor previsível e consistente que acontece ao esforço e que é aliviada pelo repouso, é característica de:
- (A) angina instável.
  - (B) angina variante.
  - (C) isquemia silenciosa.
  - (D) angina estável.
  - (E) angina intratável.
- 3) De acordo com Ivo Gelain, há circunstâncias em que o segredo profissional pode ser revelado e outras em que deve ser manifestado a quem de direito. Deve-se revelar um segredo
- (A) quando o dono o permite.
  - (B) quando o bem comum o exige.
  - (C) quando o bem de terceira pessoa o exige.
  - (D) nas perícias médico-legais.
  - (E) quando o bem do depositário o exige.
- 4) A descida do leite materno, ou sua apojadura, ocorre
- (A) dias antes do parto normal ou cesário.
  - (B) na primeira hora após o parto.
  - (C) durante o trabalho de parto normal.
  - (D) entre 06 a 12 horas após o parto cesário.
  - (E) entre 48 a 72 horas após o parto.

- 5) Com relação à vacina BCG é correto afirmar que
- (A) o teste tuberculínico é indispensável, antes da aplicação da BCG.
  - (B) a evolução da reação vacinal é: nódulo local, úlcera, crosta e pústula, respectivamente.
  - (C) tem como eventos adversos mais comuns: a formação de abscesso e/ou ulceração, no local da aplicação; linfadenite regional, vermelhidão e febre.
  - (D) é contra-indicada nos indivíduos HIV-positivos sintomáticos.
  - (E) após a reconstituição, deve ser utilizada no prazo máximo de 8 horas.
- 6) Dentre as glândulas do sistema endócrino estão:
- (A) hipófise, tireóide e vesícula.
  - (B) tireóide, vesícula e parótidas.
  - (C) hipófise, parótidas e hipotálamo.
  - (D) hipófise, tireóide e ovários.
  - (E) vesícula, hipotálamo e ovários.
- 7) As talassemias constituem um grupo de distúrbios hereditários associados à síntese defeituosa da cadeia de hemoglobina. Qual das características abaixo NÃO pertence a talassemia?
- (A) Hipocromia.
  - (B) Microcitose.
  - (C) Hemólise.
  - (D) Hepatomegalia.
  - (E) Graus variáveis de anemia.
- 8) Na difteria, a presença de membranas na orofaringe ocorre
- (A) nas primeiras 10h do início.
  - (B) após 24h do início.
  - (C) nas primeiras 2h do início.
  - (D) após 2 dias do início.
  - (E) após 72h do início.
- 9) Dentre as complicações da pericardiocentese encontra-se
- (A) a laceração pleural.
  - (B) a ruptura miocárdica.
  - (C) o choque cardiogênico.
  - (D) o infarto agudo do miocárdio.
  - (E) a pericardite.

- 10) Quanto aos cuidados de enfermagem no pós-operatório imediato, assinale a opção correta.
- (A) A diurese deve ser sempre por cateterismo vesical de demora.
  - (B) Retirar a cânula de guedel assim que o paciente chegar a recuperação pós-anestésica.
  - (C) Manter drenos e sondas clampeados durante a permanência do paciente na recuperação pós anestésica.
  - (D) Alimentar o paciente assim que recuperar a consciência, para evitar hipoglicemia devido ao jejum.
  - (E) Não fazer comentários indevidos perante o paciente inconsciente ou sonolento.
- 11) Qual o posicionamento do paciente na mesa de exames, quando a posição de litotomia é empregada?
- (A) Sobre um dos lados com um travesseiro de 12 a 15 cm sob a região lombar.
  - (B) Apoio horizontal total sobre as costas, um braço ao lado da mesa e o outro sobre uma tala.
  - (C) Cabeça e corpo abaixados e com suportes de ombro acolchoados.
  - (D) Apoiado na horizontal sobre a região frontal com a cabeça lateralizada.
  - (E) Decúbito dorsal, com as pernas e coxas flexionadas e os pés em estribos.
- 12) Com relação à redução do fumo durante a gestação, é correto afirmar que
- (A) não há efeitos evidentes durante a gestação sobre baixo peso ao nascer.
  - (B) os efeitos em relação a partos prematuros são consistentes.
  - (C) foi encontrado efeito sobre a prevalência de peso abaixo de 1500g.
  - (D) não há nenhum efeito do fumo sobre a mortalidade precoce.
  - (E) não é uma medida prioritária para a redução da mortalidade de menores de 5 anos no Brasil.

- 13) Dentre os cuidados de enfermagem abaixo, assinale o indicado em caso de extravasamento de quimioterápicos vesicantes.
- (A) Retirar a agulha do local e elevar o membro afetado à altura acima do coração.
  - (B) Interromper a infusão da droga após 10 minutos, mantendo a agulha no local.
  - (C) Aplicar compressas quentes por 15 minutos a cada 12 horas.
  - (D) Aspirar a droga do sítio e cobri-lo com um curativo.
  - (E) Friccionar o local para aliviar a dor.
- 14) Com relação à Central de Material Esterilizado, assinale a opção INCORRETA.
- (A) Deve esterilizar os materiais de acordo com as normas de funcionamento das autoclaves e estufas.
  - (B) Deve fazer a desinfecção dos materiais de acordo com as recomendações do uso dos detergentes químicos.
  - (C) Deve controlar a qualidade e integridade dos materiais a serem esterilizados ou desinfetados.
  - (D) Deve fazer periodicamente testes de controle de esterilidade dos materiais.
  - (E) Deve refazer diariamente a esterilização de todos os materiais não utilizados no dia anterior.
- 15) Sessenta e nove por cento dos idosos brasileiros relatam ter pelo menos uma doença ou condição crônica, sendo essa proporção maior entre as mulheres (75%) do que entre os homens (62%). No Brasil, as doenças mais frequentemente relatadas pela população idosa são:
- (A) menopausa e andropausa.
  - (B) pneumonia e desnutrição.
  - (C) hipertensão e artrite.
  - (D) atropelamento e queda.
  - (E) diabetes mellitus e úlcera péptica.
- 16) São manifestações clínicas de todos os tipos de diabetes:
- (A) oligúria, hematúria e polidipsia.
  - (B) polidipsia, polifagia e poliúria.
  - (C) polifagia, hematúria e oligúria.
  - (D) polidipsia, poliúria e anorexia.
  - (E) poliúria, anorexia e hematúria.

- 17) Em relação aos cuidados profiláticos com os olhos do recém-nascidos, deve-se preparar
- (A) sulfato de zinco 2%.
  - (B) solução de brometo de flúor 1%
  - (C) solução de nitrato de prata 1%.
  - (D) cloreto de potássio 2%.
  - (E) permanganato de potássio 2%.
- 18) Na ocorrência de feridas, com relação aos fatores que afetam a cicatrização normal, pode-se afirmar que
- (A) a técnica de curativo não afeta a cicatrização.
  - (B) o edema dificulta a união das bordas da ferida e aumenta a vascularização local.
  - (C) drogas como a heparina e a vitamina k estimulam a cicatrização.
  - (D) o nível glicêmico sanguíneo não afeta a cicatrização.
  - (E) os corticóides mascaram a presença de infecção.
- 19) Uma das condutas indicadas na prevenção de infecções durante o atendimento ao paciente com trauma, é
- (A) imobilizar as fraturas.
  - (B) controlar as hemorragias.
  - (C) prevenir o choque.
  - (D) prevenir o tétano.
  - (E) estabelecer vias aéreas.
- 20) Qual o exame realizado para detectar o câncer de colo de útero, que toda mulher deve fazer rotineiramente?
- (A) Dosagem hormonal.
  - (B) Tomografia abdominal.
  - (C) esfregaço de papanicolaou.
  - (D) Ultra-sonografia abdominal.
  - (E) Radiografia contrastada.

- 21) Quanto aos cuidados pré-operatórios de rotina, pode-se afirmar que
- (A) deve ser feito o encaminhamento do paciente com papeleta e prontuário ao centro cirúrgico.
  - (B) deve ser iniciado o jejum completo com, no máximo, seis horas de antecedência.
  - (C) deve ser realizada a tricotomia com mais de oito horas de antecedência da cirurgia.
  - (D) deve ser realizada a lavagem intestinal impreterivelmente na manhã antes do procedimento cirúrgico.
  - (E) deve ser realizada punção venosa profunda antes de encaminhar o paciente ao centro cirúrgico.
- 22) Entre os cuidados de enfermagem abaixo, assinale o que NÃO é indicado em uma parada cardio-respiratória.
- (A) Preparar material para desfibrilação, ajustando a carga elétrica.
  - (B) Posicionar o paciente promovendo a hiperflexão do pescoço.
  - (C) Dar suporte ventilatório com ambú e máscara.
  - (D) Instalar monitorização cardíaca em DII.
  - (E) Puncionar veia em membros superiores, para administrar medicações.
- 23) Sabe-se que as anotações de enfermagem são importantes para a manutenção e o registro da evolução do paciente no dia a dia de um hospital. É correto afirmar que essas anotações são de responsabilidade
- (A) do Enfermeiro responsável pela unidade.
  - (B) exclusiva do profissional que acompanha o paciente.
  - (C) de todos os membros da equipe de enfermagem que prestam cuidados diretos ao paciente.
  - (D) exclusiva do Técnico de Enfermagem.
  - (E) de todos os membros da equipe de enfermagem do setor em que o paciente está internado.
- 24) "Alertar o profissional, quando diante de falta cometida por imperícia, imprudência e negligência" é um artigo do Código de Ética Profissional presente no Capítulo
- (A) das responsabilidades.
  - (B) dos deveres.
  - (C) dos direitos.
  - (D) das proibições.
  - (E) dos princípios Fundamentais.

Prova : Verde  
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : PS-CAP/08

- 25) A incapacidade para expressar ou compreender a linguagem, decorrente de causas neurológicas, chama-se
- (A) ataxia.
  - (B) apraxia.
  - (C) afasia.
  - (D) hemianopsia.
  - (E) disartria.
- 26) Em relação ao acidente vascular cerebral, assinale a opção que constitui um fator de risco imediato.
- (A) Hematócrito baixo.
  - (B) Baixos níveis de colesterol.
  - (C) Hipoalbuminemia.
  - (D) Bradicardia sinusal.
  - (E) Fibrilação atrial.
- 27) Um paciente que tem um débito urinário de 300ml/dia apresenta
- (A) poliúria
  - (B) disúria.
  - (C) nictúria.
  - (D) oligúria.
  - (E) anúria.
- 28) Quanto aos procedimentos relacionados ao paciente com cateter urinário, é correto afirmar que
- (A) o sistema de drenagem aberta está indicado para períodos de sondagem longa.
  - (B) para coletar urina para exames, deve-se desconectar o sistema de drenagem.
  - (C) para esvaziamento do sistema coletor, recomenda-se usar luvas estéreis.
  - (D) a bolsa coletora deve ser esvaziada com intervalo mínimo de 12 horas.
  - (E) se for necessário elevar a bolsa coletora ao nível da bexiga do paciente, deve-se clampeá-la antes.

- 29) A inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem é considerada
- (A) infração disciplinar.
  - (B) infração ética.
  - (C) censura.
  - (D) processo.
  - (E) admoestação.
- 30) Qual é o agente etiológico da sífilis?
- (A) Entamoeba hartmanni.
  - (B) Naegleria fowleri.
  - (C) Treponema pallidum.
  - (D) Helicobacter pylori.
  - (E) Pneumocystis carinii.
- 31) Paciente de 65 anos é admitido na Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital, com sintomas de Acidente Vascular Hemorrágico. Para estes casos, um dos cuidados de enfermagem indicado é:
- (A) manter a cabeceira sempre em zero graus.
  - (B) administrar os anticonvulsivantes prescritos.
  - (C) medir a pressão arterial de 4 em 4 horas.
  - (D) fornecer oxigenação adequada para minimizar a hiperoxia cerebral.
  - (E) estimular atividades ao paciente.
- 32) No período pós-operatório devido à diminuição do peristaltismo, o paciente pode apresentar sintomas como:
- (A) náuseas e febre.
  - (B) náuseas e vômitos.
  - (C) hemorragia e vômitos.
  - (D) hemorragia e choque.
  - (E) febre e choque.
- 33) Para a realização da Colonoscopia Fibróptica o paciente deve, antes do exame, limitar a ingestão de líquidos no período de
- (A) 2 a 6h
  - (B) 6 a 12h
  - (C) 12 a 24h
  - (D) 24 a 72h
  - (E) 72 a 96h

- 34) O teste de Mitsuda, recomendado para a distinção dos casos neurais sem lesão cutânea na Hanseníase, tem valor
- (A) diagnóstico.
  - (B) prognóstico.
  - (C) profilático.
  - (D) imunizador.
  - (E) preventivo.
- 35) São indicações para Nutrição Parenteral, EXCETO:
- (A) preparo pré-operatório de pacientes desnutridos, em caso de estenose ou carcinoma de esôfago.
  - (B) todos os pacientes em tratamento de quimioterapia e radioterapia.
  - (C) em pacientes com inadequada administração oral nos estados de má absorção, como nas queimaduras extensas.
  - (D) processos inflamatórios intestinais como as colites e as diverticulites.
  - (E) nos casos de íleo paralítico e fístulas biliares e pancreáticas.
- 36) São considerados como de baixo peso ao nascer (BPN) todos os recém nascidos com peso inferior a quantos gramas?
- (A) 2500
  - (B) 2750
  - (C) 2950
  - (D) 3000
  - (E) 3100
- 37) Dentre os procedimentos abaixo, assinale aquele em que o paciente deve ser mantido em decúbito ventral, imediatamente após a sua realização.
- (A) Paracentese.
  - (B) Biopsia renal.
  - (C) Toracocentese.
  - (D) Drenagem de tórax.
  - (E) Colectomia.

- 38) Um paciente de 30 anos chega à emergência de um hospital apresentando sinais de Infecção Aguda do Apêndice. Neste caso, ele deve sofrer intervenção cirúrgica
- (A) opcional.
  - (B) necessária.
  - (C) emergencial.
  - (D) eletiva.
  - (E) urgente.
- 39) Qual das substâncias abaixo é essencial à glândula tireóide para síntese de seus hormônios?
- (A) Glicose.
  - (B) Sódio.
  - (C) Potássio.
  - (D) Iodo.
  - (E) Cálcio.
- 40) No preparo do equipamento para diálise peritoneal, pode-se acrescentar heparina no líquido dializador para
- (A) aumentar a absorção de vitaminas.
  - (B) elevar a concentração dos eletrólitos.
  - (C) prevenir infecção peritoneal.
  - (D) evitar a oclusão do cateter.
  - (E) diminuir o fluxo venoso.
- 41) No atendimento de emergência, a lavagem gástrica está CONTRA-INDICADA nas intoxicações por
- (A) corrosivos ácidos.
  - (B) inseticidas.
  - (C) detergentes.
  - (D) barbitúricos.
  - (E) organofosforados (Chumbinho).

- 42) Em relação ao uso de corticosteróides, é correto afirmar que
- (A) o aumento de peso nos pacientes, pode ser indicio de edema resultante da retenção de água e sódio.
  - (B) a administração por via oral não deve ser acompanhada de leite, pois estimula o desconforto e causa complicações gástricas.
  - (C) a suspensão do medicamento deve ser feita abruptamente para evitar insuficiência aguda da função cortical adrenal.
  - (D) os pacientes submetidos a esta terapia estão propensos a apresentar hipotensão.
  - (E) cefaléia, hipertensão arterial e oligúria são sinais e sintomas apresentados nos casos de hiponatremia.
- 43) Dentre as drogas apresentadas nas opções abaixo, assinale a que tem efeito ansiolítico.
- (A) Amplictil.
  - (B) Diazepan.
  - (C) Haldol.
  - (D) Rohypnol.
  - (E) Neozine.
- 44) Houve uma queda acentuada na mortalidade por diarreia no país. O manejo apropriado dos casos de diarreia é altamente efetivo no controle desta. Em sua grande maioria, os casos de diarreia podem ser tratados em casa com
- (A) terapia de Reidratação Oral (TRO).
  - (B) suplementação com vitamina A.
  - (C) soro Fisiológico a 3%.
  - (D) suco de frutas com adoçante.
  - (E) soro Glicosado a 10%.
- 45) O período de incubação da Hepatite A varia de
- (A) 7 - 10 dias.
  - (B) 27 - 35 dias.
  - (C) 28 - 160 dias.
  - (D) 15 - 180 dias.
  - (E) 14 - 42 dias.

- 46) São sinais e sintomas que sugerem atelectasia pulmonar aguda:
- (A) febre, convulsão e calafrios.
  - (B) tosse, dispnéia e taquicardia.
  - (C) tosse, febre e convulsão.
  - (D) dispnéia, febre, náuseas.
  - (E) taquicardia, náuseas, convulsão.
- 47) Após uma acidente automobilístico e exposição à incêndio, um casal de meia idade foi encaminhado para a emergência de um hospital. O homem tinha queimadura de 2° grau no tórax anterior e em todo o braço esquerdo, e a mulher tinha queimadura de 3° grau em toda extensão dos membros inferiores. Pela avaliação da regra dos nove, eles apresentavam, respectivamente, qual percentagem de superfície corporal queimada?
- (A) 25% e 18%
  - (B) 20% e 27%
  - (C) 27% e 36%
  - (D) 36% e 45%
  - (E) 45% e 54%
- 48) Os portadores de tuberculose pulmonar geralmente apresentam os seguintes sintomas:
- (A) perda ponderal, prurido e dor torácica.
  - (B) perda ponderal, cianose e prurido.
  - (C) hemoptise, tosse e sudorese noturna.
  - (D) hemoptise, dor torácica e cianose.
  - (E) tosse, prurido e sudorese noturna.
- 49) Assinale a opção que completa as lacunas, tornando a afirmativa a seguir verdadeira.
- Quando possível, os artigos \_\_\_\_\_ devem ser \_\_\_\_\_.
- Caso não seja possível essa prática, deve-se submetê-los à \_\_\_\_\_.
- (A) críticos, esterilizados, desinfecção.
  - (B) semi-críticos, esterilizados, assepsia.
  - (C) críticos, desinfetados, assepsia.
  - (D) semi-críticos, esterilizados, desinfecção.
  - (E) críticos, esterilizados, assepsia.

50) São sinais e sintomas psíquicos e físicos do Delirium tremens:

- (A) desorientação e desidratação.
- (B) alucinações visuais e hipotermia.
- (C) idéias de perseguição e hipotensão.
- (D) delírios e bradicardia.
- (E) idéias de grandeza e hipotensão.